

SECRETARIA DA SAÚDE-RS

CADERNO DE EXERCÍCIOS Técnico de Enfermagem





HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2020
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 28 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Internação Pediátrica e Internação Neonatal)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, réguas, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, o técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de Enfermagem. Entre as atividades descritas abaixo, cabe ao técnico de enfermagem, conforme a Lei nº 7.498:

- (A) participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
- (B) supervisionar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.
- (C) estabelecer e definir as medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis, em geral, em programas de vigilância epidemiológica.
- (D) coordenar a equipe de saúde na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
- (E) elaborar e definir as medidas com relação à prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.

02. A manutenção de acessos venosos para a administração de medicamentos apresenta riscos locais, tais como hiperemia e edema. Dos cuidados de enfermagem abaixo descritos, qual possibilitaria a monitorização do aparecimento de tais riscos, constituindo-se medida de prevenção extra para evitar a infecção de corrente sanguínea?

- (A) Trocar todos os cateteres periféricos a cada 72 horas, em crianças; nesta prática, o curativo pode ser oclusivo.
- (B) Realizar a troca do cateter de inserção periférica (PICC) com data pré-estabelecida, ajudando a prevenir infecção. O curativo do cateter PICC pode contar com um estabilizador, ou não, já que este possui ponto de fixação.
- (C) Realizar proteção do acesso, de preferência com curativos semipermeáveis transparentes e verificar se está bem fixado na pele. Os curativos devem ser trocados, pelo menos, a cada 5 a 7 dias, possibilitando a avaliação frequente do sítio de inserção.
- (D) Aplicar calor úmido (compressa embebida em soro fisiológico aquecido) para diminuir o edema sobre o curativo, se houver vermelhidão, edema e a pele na região do acesso estiver quente.
- (E) Observar o local de punção exposto de forma mais efetiva, não havendo, por essa razão, necessidade, no momento do banho, de proteger o acesso venoso para evitar que caia água no local.

03. A criança traqueostomizada depende muito da equipe de enfermagem. A traqueostomia constitui uma porta aberta à entrada de micro-organismos patogênicos para vias respiratórias inferiores, aumentando o risco de infecção.

Durante a aspiração de vias áreas superiores da criança traqueostomizada, cuidados de enfermagem devem ser implantados. Com relação a esse tema, assinale a afirmação correta.

- (A) A dimensão ou calibre do cateter de aspiração é escolhido empiricamente. Pode-se introduzi-lo já aspirando, sem realizar a pinça na sonda de aspiração, para facilitar a remoção das secreções. Deve-se utilizar os equipamentos de proteção individual.
- (B) Deve-se posicionar a criança adequadamente. Deve-se calcular a extensão da sonda de aspiração a ser introduzida até 0,5 cm, ou até a ponta final da cânula de traqueostomia. Repetir a aspiração quantas vezes forem necessárias; a quantidade e a qualidade das secreções determinam a frequência das aspirações. Deve-se utilizar os equipamentos de proteção individual.
- (C) Mesmo com sistema fechado de aspiração existe a necessidade de desconectar a criança do ventilador (CPAP ou BiPAP) para realizar uma aspiração efetiva. Deve-se utilizar os equipamentos de proteção individual.
- (D) Deve-se aspirar por mais de 15 segundos, repetidas vezes, sem intervalo. O fator tempo é um determinante muito importante para evitar a hipóxia na remoção de um volume grande de secreções.
- (E) As aspirações de secreções em crianças traqueostomizadas devem ser limitadas e realizadas poucas vezes. Não são fatores influenciadores da frequência deste cuidado a oximetria e a quantidade de secreção.

04. Considere as seguintes afirmações sobre cuidados paliativos em pediatria.

- I - O cuidado paliativo é o cuidado total ativo do corpo, mente e espírito da criança e envolve dar apoio à família. Cuidados paliativos eficazes requerem uma abordagem multidisciplinar ampla que inclui a família e faz uso dos recursos comunitários disponíveis; isso pode ser implementado com sucesso, mesmo que os recursos sejam limitados.
- II - As intervenções de cuidados paliativos servem para acelerar a morte. Proporcionam o controle da dor e dos sintomas, a atenção para as questões enfrentadas pela criança e pela família relacionadas à morte, e a promoção da qualidade de vida durante o tempo que resta para a criança.
- III - O cuidado paliativo começa quando a condição é diagnosticada e continua independentemente de a criança receber ou não tratamento dirigido para a condição. Os profissionais de saúde devem aliviar o sofrimento físico, psicológico e social da criança.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) Apenas I e III.

05. Os *Pediatric Early Warning Scores* (PEWS) têm sido desenvolvidos nos últimos 10 anos, com a finalidade de _____ sinais _____ clínica em crianças hospitalizadas a partir da aplicação de critérios ou escores de alerta. Esses sistemas de pontuação de _____ sinalizam para a equipe os pacientes com risco para eventos adversos graves, por meio da observação periódica de sinais clínicos e critérios pré-determinados que despertem para cuidados urgentes. Os PEWS devem fazer parte de um conjunto de _____ para atender, de forma _____ e precoce, pacientes em risco para deterioração clínica.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) alertar – de gravidade – alerta tardio – protocolos – eficiente
 (B) registrar – de alerta – gravidade precoce – ações – eficaz
 (C) identificar – de gravidade – vigilância total – condutas – eficaz
 (D) registrar – de deterioração – gravidade total – protocolos – ágil
 (E) identificar – de deterioração – alerta precoce – ações – rápida

06. Em relação à terapêutica medicamentosa na pediatria, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A alergia à penicilina é associada ao início imediato (dentro de 1 hora após a administração) ou acelerado (superior a 72 horas depois da administração) de erupções na pele (*rash* cutâneo) ou sintomas mais graves, como edema da laringe e choque anafilático.
- () A dose ideal de um analgésico é aquela que controla a dor, não sendo necessária a preocupação com efeitos colaterais. A dose indicada deve ser sempre a máxima, sem necessidade de titulação.
- () Os possíveis efeitos colaterais do ibuprofeno em crianças incluem náuseas, vômitos, diarreia, constipação, ulceração gástrica, nefrite, hematúria e retenção urinária.
- () O uso de placebos é comum para determinar se o paciente está tendo dor, fornecendo informação útil sobre a presença de dor ou gravidade desta.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
 (B) F – V – V – F.
 (C) V – F – V – F.
 (D) V – V – F – F.
 (E) F – V – V – V.

07. Sobre os cuidados de enfermagem para prevenir úlceras de pressão, considere as afirmações abaixo.

- I - A avaliação física da criança que está imobilizada por várias razões (ferimento ou doença) inclui foco não apenas na parte lesada, mas também na função de outros sistemas que podem ser afetados secundariamente. O impacto fisiológico da imobilização também deve ser abordado em crianças que requeiram imobilidade total prolongada e que não consigam se mover sozinhas. A Escala Braden Q é uma ferramenta confiável e objetiva que pode ser usada para avaliar o risco de úlceras de pressão.
- II - A avaliação física da criança que está imobilizada inclui foco apenas na parte lesada. Com imobilização a longo prazo é muito raro ocorrer comprometimento neurológico e alterações de eletrólitos (especialmente cálcio), do balanço de nitrogênio e da taxa metabólica geral. O impacto fisiológico da imobilização não deve ser abordado. Para as crianças que requeiram imobilidade total prolongada e que não consigam se mover sozinhas no leito, não existe predisponente para a formação de lesões de pressão.
- III- Os cuidados de enfermagem de crianças em risco incluem estratégias para prevenir a lesão de continuidade cutânea quando essas condições estiverem presentes. As crianças com maior risco de laceração da pele são aquelas com imobilização prolongada, em ventilação mecânica, com moldes gessados e dispositivos auxiliares, incluindo órteses, próteses e cadeiras de rodas. Fatores de risco adicionais incluem nutrição inadequada, fricção (decorrente dos lençóis com tração) e pele úmida (devido à urina ou perspiração).

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

08. Considere as seguintes afirmações sobre sono e repouso.

- I - O sono, função protetora em todos os organismos, permite o reparo e a recuperação de tecidos após atividade. Assim, como na maioria dos aspectos do desenvolvimento, existe uma ampla variação na quantidade e distribuição de sono, entre as crianças, nas diferentes idades.
- II - À medida que as crianças amadurecem, ocorre uma alteração no tempo total dispendido no sono e na quantidade de tempo dispendido no sono profundo. Os recém-nascidos dormem a maior parte do tempo que não é ocupado com alimentação ou outros aspectos dos cuidados. À medida que os lactentes evoluem, o tempo total gasto com o sono diminui gradualmente, eles permanecem acordados por períodos mais longos e dormem mais à noite.
- III- Para ajudar uma criança a dormir melhor não se faz necessário estabelecer uma rotina de horários. O sono pode ser iniciado independentemente do conforto. Ambientes organizados, limpos e de alta luminosidade podem oferecer maior conforto para a criança.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

09. Uma criança está internada no hospital com um exantema não diagnosticado. Por essa razão, deve-se implementar medidas de precaução até o diagnóstico ser confirmado. Com base nessa afirmativa, qual medida deve-se implementar com o intuito de reduzir o risco de infecção de fontes não reconhecidas?

- (A) Precaução padrão.
(B) Precaução por gotículas.
(C) Precaução de contato.
(D) Precaução de via aérea.
(E) Precaução de aerossóis.

10. As crianças submetidas à traqueostomia devem ser cuidadosamente monitoradas. Os focos do cuidado de enfermagem devem ser: manter a via aérea permeável, facilitar a remoção de secreções pulmonares e manter o estoma limpo. Com relação a esse tema, considere os cuidados abaixo.

- I - Avaliação do padrão respiratório, esforço respiratório, sons, sinais vitais e aperto das tiras de fixação de traqueostomia.
- II - Quantificação de secreção, sinalização do aspecto; se houver secreção sanguinolenta, reportar a equipe e sinalizar ao médico assistente.
- III- Realização de aspirações de secreção sem limite de tempo, sem intervalos, até que a cânula de traqueostomia esteja limpa e, após, monitorar a saturação.

Quais podem ser considerados adequados ao paciente traqueostomizado?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

11. Considere as afirmativas abaixo sobre cuidado humanizado em crianças hospitalizadas.

- I - As crianças toleram bem a hospitalização e são particularmente mais resistentes aos estressores da doença e da internação.
- II - Os cuidados de enfermagem à criança hospitalizada têm o objetivo de prevenir ou minimizar a separação, o medo de uma lesão corporal e maximizar os benefícios potenciais de uma internação.
- III- O medo da dor física pode se manifestar das seguintes maneiras: expressões faciais, resistência física e agressão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

12. Com relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é correto afirmar que:

- (A) o registro de enfermagem deve ser preciso, claro e de fácil entendimento e deve gerar a continuidade do atendimento.
- (B) na ausência do enfermeiro, o técnico de enfermagem pode prescrever a assistência de enfermagem.
- (C) a SAE compreende somente uma atividade burocrática de preenchimento de formulários e instrumentos.
- (D) a avaliação de enfermagem é o passo inicial do processo de enfermagem, sendo crucial para analisar a eficácia das intervenções.
- (E) a evolução é a etapa do processo de enfermagem que desenvolve um plano de cuidados, iniciando as intervenções que forem identificadas na evolução.

13. Considere as afirmações abaixo em relação a cuidados paliativos.

- I - Atualmente, em decorrência das questões sobre a morte, o morrer e a qualidade de vida dos pacientes, tem se tornado indispensável a implantação de protocolos de cuidados paliativos nas Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), estimulando assim, uma abordagem ética do cuidar em terapia intensiva.
- II - No atendimento do paciente em cuidados paliativos os cinco estágios que esse paciente pode vivenciar durante sua terminalidade são: negação, culpa, raiva, revolta e aceitação.
- III- O cuidado paliativo tem como objetivo primário o bem-estar do paciente, permitindo-lhe uma morte digna, tranquila e sem dor. O paciente em cuidado paliativo tem contra-indicação de internação em UTIP.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

14. A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) constitui a infecção nosocomial mais comum no ambiente de cuidados intensivos. Qual das ações de enfermagem listadas abaixo diminui o risco da PAV?

- (A) Aspirar o tubo endotraqueal de hora em hora, de preferência utilizando sistemas fechados de aspiração.
- (B) Instilar soro fisiológico nas aspirações para limpeza mais eficaz do tubo endotraqueal.
- (C) Manter decúbito elevado a 30 graus em todos os momentos, a menos que seja contraindicado.
- (D) Realizar higiene oral com solução antisséptica padrão, quatro vezes ao dia.
- (E) Manter o paciente o mais acordado possível.

15. A posição prona ou decúbito ventral é utilizada como uma manobra auxiliar para a melhora das trocas gasosas, principalmente nos pacientes com diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Com relação à realização do procedimento de posição prona, é correto afirmar que:

- (A) a presença de cateteres e drenos torácicos são considerados contraindicação para a posição prona.
- (B) a cabeça do paciente deve estar voltada para um dos lados do corpo, e os braços devem permanecer paralelos a ele.
- (C) os eletrodos para monitorização cardíaca devem ser fixados em posição precordial.
- (D) no momento da realização da posição prona, são necessários no mínimo três membros da equipe multidisciplinar, sendo um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem, para posicionar o paciente com segurança.
- (E) em crianças com peso inferior a três quilogramas, a posição prona é contraindicada.

16. Em relação à insuficiência respiratória em crianças, é correto afirmar que:

- (A) a insuficiência respiratória é a quinta causa mais comum de parada cardiopulmonar em crianças.
- (B) a apneia é a cessação de movimentos respiratórios por mais de um minuto, quando associada à hipoxemia ou bradicardia.
- (C) são sinais de hipóxia mais grave: hipotensão ou hipertensão, turvação da visão, sonolência, estupor, coma, dispneia, depressão das respirações, bradicardia, cianose periférica ou central.
- (D) a asfixia e a insuficiência respiratória são emergências respiratórias que necessitam de intervenção planejada.
- (E) a principal causa de bronquiolite é o vírus adenovírus, que afeta as células epiteliais do trato respiratório.

17. A higienização das mãos é a medida isolada mais importante para prevenção de infecções hospitalares. Deve ser ensinada e continuamente reiterada. Com relação à lavagem de mãos, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) é obrigatória a higienização das mãos antes de preparar ou pesar medicamentos, alimentos, materiais, instrumentos ou equipamentos que serão usados no paciente.
- (B) mesmo com treinamento adequado, se não houver conscientização, mobilização e senso de responsabilidade, não há mudança de atitude e adesão plena às medidas necessárias.
- (C) a lavagem de mãos é desnecessária quando forem utilizadas luvas como precaução universal.
- (D) a adesão à lavagem de mãos é facilitada pela disponibilidade de pias na entrada de cada enfermaria ou quarto, onde não pode faltar o sabão, a solução alcoólica e as toalhas de papel.
- (E) o conceito de lavagem de mãos, como principal medida para evitar a transmissão de infecções, deve ser usado em casas, creches, casas de apoio, escolas, etc.

18. Considere as afirmações abaixo em relação ao pós-operatório de cirurgias de grande porte, ou seja, cirurgias que promovam maior perda de fluidos e sangue e/ou tempo de duração maior que quatro horas, tais como o transplante hepático infantil.

- I - O pós-operatório imediato compreende as 12 horas seguintes ao término da cirurgia.
- II - Na admissão do paciente, no pós-operatório, deve-se monitorizá-lo, instalar drogas em bombas de infusão, especialmente os vasoativos, a fim de garantir a estabilidade do paciente e sua segurança.
- III - No pós-operatório, deve-se posicionar corretamente drenos e sacos coletores com as extensões desclampadas, a fim de avaliar os débitos presentes de forma fidedigna e melhor conduzir a estabilidade do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

19. Em relação às lesões de pressão, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) as medidas de prevenção de lesões são bem mais simples e menos dispendiosas que o tratamento da lesão e suas complicações.
- (B) entre as medidas de prevenção de lesões de pressão destacam-se: evitar posicionar o paciente sobre áreas de pele com hiperemia ativa, usar lençol móvel ou forro de leito para mobilizar o paciente, posicionar travesseiros ou cobertores entre as proeminências ósseas e, também, não apoiar os calcâneos no colchão.
- (C) é indicado o uso de dispositivos recortados em forma de anel ou argola ou luvas cheias de água/ar, por não gerar pressões adicionais.
- (D) é indicado estabelecer rotinas de mudança de decúbito, de acordo com o risco estimado.
- (E) é indicado, de preferência, não posicionar o paciente diretamente sob um dispositivo médico.

20. Um paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) tem em sua prescrição médica a seguinte indicação: vancomicina, 80mg de 6/6horas. A apresentação do medicamento é frasco-ampola de 500mg. Devido a essa prescrição, reconstituiu-se o frasco em 10 mL de água destilada (AD). Quanto deve ser aspirado da reconstituição da vancomicina para uma (01) dose e qual volume total diário desta reconstituição, respectivamente, deve ser administrado ao paciente?

- (A) 2 mL e 8 mL.
- (B) 1,5 mL e 7,5 mL.
- (C) 1,6 mL e 6,4 mL.
- (D) 1,8 mL e 5,4 mL.
- (E) 2,2 mL e 13,2 mL.

21. A manutenção da temperatura corporal do recém-nascido (RN) é uma das maiores preocupações da equipe de enfermagem em uma Unidade Neonatal. Em relação aos mecanismos de perda de calor no período neonatal, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A principal causa de perda de calor por radiação é a grande área da pele exposta a ambiente frio, o que pode ocorrer no RN despido em incubadora, que perde calor para as paredes da mesma.
- () A perda de calor por condução ocorre quando o RN é colocado em superfície fria.
- () A perda de calor por evaporação tem como principais causas cueiros molhados, alta umidade do ambiente e ar inspirado.
- () A principal causa de perda de calor do RN prematuro é a evaporação que corresponde à perda insensível da água.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – V.

22. Em relação aos cuidados de enfermagem com o RN em fototerapia, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) A fototerapia de alta intensidade deve estar disponível na maior superfície corporal possível.
- (B) A irradiância é inversamente proporcional à distância entre as lâmpadas e o RN, ou seja, quanto menor a distância entre a luz e o RN, menor é a irradiância e a eficácia da fototerapia.
- (C) Quanto maior a superfície corpórea exposta à luz, maior é a eficácia da fototerapia.
- (D) Os RNs que recebem a luz na parte anterior e posterior do tronco, membros e que permanecem sem fraldas recebem maior irradiância espectral.
- (E) Os cuidados com fototerapia são frequentes em uma Unidade de Internação Neonatal, pois a icterícia constitui-se um dos problemas mais frequentes no período neonatal.

23. Considerando o protocolo de manuseio do recém-nascido prematuro (RNPT), é correto afirmar que:

- (A) todos os sinais vitais devem ser verificados de 1 em 1 hora, devido à possível instabilidade do RNPT.
- (B) ao realizar a troca de fralda do RNPT, pode-se elevar as extremidades inferiores, desde que mantenha o RNPT alinhado.
- (C) a cabeceira da cama deve ser elevada a 30°, mas deverá ser diminuída durante todos os procedimentos realizados no prematuro.
- (D) em RNPT pode ser utilizado berço de calor radiante, pois ocorre pouca perda insensível de água.
- (E) o RNPT deve ser mantido em linha média nas primeiras horas de vida para evitar a oscilação e o aumento do fluxo sanguíneo cerebral.

24. Em relação ao início da alimentação do recém-nascido prematuro (RNPT), é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) a administração de dieta, através de sonda enteral, deve ser realizada lentamente, pois a administração rápida pode causar vômitos e aumentar o risco de aspiração.
- (B) durante a administração da dieta por sonda enteral não deve ser utilizada a sucção não nutritiva, pois dificulta o processo digestivo.
- (C) o leite materno apresenta inúmeras vantagens, como melhor digestibilidade e capacidade de prover componentes imunológicos ao RNPT.
- (D) o uso do leite materno precocemente pode diminuir a incidência de enterocolite necrosante.
- (E) o início precoce da dieta está associado a menor tempo para recuperar o peso de nascimento, para atingir o volume enteral pleno da dieta e de hospitalização.

25. Em relação ao Método Canguru (MC), é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) o Ministério da Saúde orienta que todos os recém-nascidos de baixo peso e os recém-nascidos prematuros sejam incluídos no MC, com intuito de diminuir o tempo de internação hospitalar e garantir crescimento e desenvolvimento adequado.
- (B) diminuir os níveis de estímulos ambientais adversos da unidade neonatal, tais como odores, luzes e ruídos é importante para diminuir o estresse no recém-nascido.
- (C) a utilização de fototerapia e cateter de oxigênio contraindicam a posição canguru.
- (D) promover o livre e precoce acesso, bem como a permanência dos pais na unidade neonatal, deve ser estimulado pelos profissionais de saúde.
- (E) deve-se propiciar o contato pele a pele precoce, respeitando as condições clínicas do recém-nascido.

26. Em uma unidade de terapia intensiva neonatal a incubadora é utilizada frequentemente. Assinale a alternativa que contém somente ocorrências prejudiciais ao recém-nascido (RN), quando o manuseio da incubadora é realizado de maneira inadequada.

- (A) Risco de quedas, isolamento a agentes contaminantes, ruídos.
- (B) Ambiente umidificado, isolamento a agentes contaminantes, visão completa do RN.
- (C) Hipotermia neonatal, isolamento a agentes contaminantes, visão completa do RN.
- (D) Isolamento a agentes contaminantes, visão incompleta do RN, risco de quedas.
- (E) Hipotermia neonatal, exposição à hipertermia, ruídos.

27. Em relação à infiltração ou extravasamento de soluções endovenosas no período neonatal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A má perfusão periférica contribui para a ocorrência de infiltração ou extravasamento.
- (B) O extravasamento de soluções intravenosas fora da parede vascular causa irritação, isquemia, destruição de tecidos e necrose.
- (C) As lesões que ocorrem nas extremidades, como pés e mãos, podem atingir outras estruturas como tendões e nervos, causando alterações nas extremidades.
- (D) É raro a ocorrência de infiltração e extravasamento de soluções endovenosas em neonatos.
- (E) Deve-se interromper a infusão venosa nos primeiros sinais de irritação, flebite e extravasamento.

28. De acordo com a administração segura de medicamentos em recém-nascidos (RN), é correto afirmar que:

- (A) a melhor região indicada para administração de medicação intramuscular é o músculo vasto lateral da coxa.
- (B) em RN menor que 1000 gramas a administração de medicação intramuscular não poderá exceder 0,50 mL de volume.
- (C) o volume máximo a ser administrado por via subcutânea é 0,5 mL.
- (D) não é recomendado o corte do supositório para administração de medicação retal.
- (E) para administração de medicação por via subcutânea deve-se considerar a angulação de 30 graus em relação a pele.

29. As doenças pulmonares no período neonatal apresentam-se clinicamente de forma característica e comum aos recém-nascidos. O reconhecimento desses sinais e sintomas são imprescindíveis aos profissionais de enfermagem na identificação da dificuldade respiratória. Assinale a alternativa correta quanto aos sinais e sintomas respiratórios especificamente observados no período neonatal.

- (A) Tosse, apneia e retração.
- (B) Taquipneia, batimento asa de nariz e cianose.
- (C) Taquipneia, tosse e cianose.
- (D) Choro forte, cianose e taquicardia.
- (E) Gemido, apneia e taquicardia.

30. Com o avanço do conhecimento e desenvolvimento tecnológico, observa-se o emprego crescente de tratamentos invasivos e cuidados intensivos para manter a vida dos bebês. Por outro lado, essas práticas ocasionam, muitas vezes, dor e sofrimento. Frente a isso, intervenções não farmacológicas têm sido recomendadas para o alívio e manejo da dor. Assinale a alternativa que **NÃO** se refere a uma intervenção não farmacológica.

- (A) Sucção não nutritiva.
- (B) Contato pele a pele.
- (C) Administração de substância adocicada por via oral (SACAROSE).
- (D) Administração de anestésicos locais.
- (E) Amamentação.

31. O termo NADIR é o tempo transcorrido entre a aplicação da quimioterapia e o menor valor da contagem hematológica. O tempo para a recuperação medular é de

- (A) 5 a 7 dias.
- (B) 7 a 14 dias.
- (C) 5 a 10 dias.
- (D) 10 a 15 dias.
- (E) 14 a 20 dias.

32. A medula óssea suprimida pelas drogas torna-se incapaz de repor os elementos sanguíneos circulantes. Com base nesta informação, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as nomenclaturas aos efeitos nos elementos figurados no sangue.

- (1) Trombocitopenia
- (2) Neutropenia
- (3) Anemia
- (4) Leucopenia

- () Diminuição dos glóbulos vermelhos.
- () Diminuição dos glóbulos brancos
- () Diminuição das plaquetas.
- () Diminuição dos neutrófilos.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 4 – 2.
- (B) 3 – 2 – 4 – 1.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 3 – 4 – 1 – 2.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

33. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as quimioterapias às medicações e ações dos sistemas vitais de proteção, conforme os protocolos de administração de quimioterápicos.

- (1) Metrotexato
- (2) Cisplatina
- (3) Ifosfamida

- () hiperhidratação e administração de droga vesico protetora (mensna).
- () alcalinização com bicarbonato de sódio endovenoso.
- () uso de manitol, prevenindo a disfunção renal.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

34. Extravasamento é o escape de drogas do vaso sanguíneo para os tecidos circunjacentes. As drogas podem ter características vesicantes ou irritantes. Sobre esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - Drogas vesicantes são aquelas que provocam irritação severa com formação de vesículas.
- II - Drogas irritantes provocam reação cutânea menos intensa, sem necrose tecidual ou formação de vesículas.
- III- Para a aplicação de antineoplásicos, deve-se escolher veias situadas longe de articulações, tendões, nervos e lesões.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

35. A leucemia é uma proliferação desordenada dos glóbulos brancos imaturos nos tecidos formadores do sangue do corpo. Com base nesta informação, considere as afirmações abaixo.

- I - Disfunção da medula óssea tem como consequências anemia, neutropenia e plaquetopenia.
- II - Fígado e baço aumentados são consequências de infiltração e fibrose eventual.
- III- O hipometabolismo é resultante da privação de nutrientes pelas células invasoras.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

36. O tratamento da leucemia envolve o uso de quimioterápicos em quatro fases. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A terapia de indução alcança a remissão parcial da medula óssea.
- (B) A terapia do sistema nervoso central previne que ele seja invadido por células leucêmicas.
- (C) A terapia de intensificação erradica as células leucêmicas residuais, mas não previne o surgimento de clone de células leucêmicas resistentes.
- (D) A terapia de manutenção serve para manter a fase de indução.
- (E) O transplante de medula óssea é recomendado para crianças, como primeira linha de tratamento.

37. Os linfomas são um grupo de doenças que se originam no sistema linfóide e hematopoético. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta sintomas do linfoma de Hodgkin.

- (A) Convulsão, anorexia, febre e prurido.
- (B) Febre, perda de peso, sudorese noturna, dor abdominal, náusea e prurido.
- (C) Sangramento, dor abdominal e cefaleia.
- (D) Confusão mental, sudorese noturna e febre.
- (E) Alterações de humor, pele seca e alteração da marcha.

38. O retinoblastoma é o tumor intraocular maligno congênito mais comum na infância. Sobre esse tumor, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O retinoblastoma é causado pela mutação em um gene e, raramente, é hereditário.
- () A leucoria – brilho esbranquiçado na pupila – é uma das principais características do retinoblastoma.
- () O estrabismo é o segundo sinal observado no retinoblastoma.
- () O primeiro passo do diagnóstico é reconhecer a importância dos relatos familiares com relação à suspeita de anormalidades no olho da criança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – V – V – F.

39. Os antineoplásicos podem desencadear alterações metabólicas importantes. Sobre esse assunto relacione a coluna da direita com a da esquerda, associando os termos às suas respectivas características.

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| (1) Hipomagnesemia. | () Elevação do ácido úrico. |
| (2) Hiponatremia. | () Diminuição do magnésio sérico. |
| (3) Hipercalcemia. | () Diminuição do sódio sérico. |
| (4) Hiperuricemia. | () Elevação do cálcio sérico. |

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4
- (B) 4 – 1 – 2 – 3
- (C) 2 – 4 – 1 – 3
- (D) 1 – 2 – 3 – 4
- (E) 3 – 1 – 2 – 4

40. A mucosite é uma resposta inflamatória das membranas mucosas à ação das drogas antineoplásicas. Com relação à mucosite é correto afirmar que:

- (A) denomina-se estomatite quando o esôfago é acometido.
- (B) denomina-se esofagite quando o reto é acometido.
- (C) denomina-se proctite quando a cavidade oral é acometida.
- (D) as alterações da mucosa são mais frequentes pós-quimioterapia.
- (E) as infecções da cavidade oral são causadas por fungos ou vírus e o tratamento deve ser relacionado com o agente causal.



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2020 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 28

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Pediátrica e Internação Neonatal)

01.	A	11.	E	21.	A	31.	B
02.	C	12.	A	22.	B	32.	D
03.	B	13.	A	23.	E	33.	E
04.	E	14.	C	24.	B	34.	E
05.	E	15.	B	25.	C	35.	B
06.	A	16.	C	26.	E	36.	B
07.	D	17.	C	27.	D	37.	E
08.	D	18.	E	28.	A	38.	A
09.	A	19.	C	29.	B	39.	B
10.	D	20.	C	30.	D	40.	D



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 04/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 51 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Centro de Tratamento Intensivo)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. **Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- 12 Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal. (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Em relação à dor no paciente crítico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Pacientes recebendo sedoanalgesia de forma insuficiente podem apresentar agitação psicomotora, que os predispõe a eventos adversos potencialmente nocivos.
- (B) A dor é descrita como 5º sinal vital, sendo registrada à semelhança dos demais parâmetros vitais em todos os pacientes.
- (C) A avaliação da dor é complexa; além de sua intensidade, devem-se avaliar outras características.
- (D) Na terapia intensiva, a escala visual analógica é um instrumento para avaliação da intensidade da dor.
- (E) Em pacientes críticos que não podem se comunicar, a avaliação de comportamentos em relação à dor, como movimentos, expressões faciais e postura, não é útil.

02. Em relação ao transporte intra-hospitalar de pacientes graves, assinale a afirmação correta.

- (A) O transporte favorece a ocorrência de estabilidade hemodinâmica e respiratória.
- (B) Durante o transporte de paciente crítico em ventilação mecânica, é suficiente a utilização de oximetria de pulso.
- (C) A equipe de transporte deve ser sempre fixa, independente do estado clínico do paciente.
- (D) Os alarmes dos equipamentos, como monitor e ventilador mecânico, devem estar adequadamente ajustados para cada transporte.
- (E) É indicada a interrupção de drogas vasoativas durante o transporte.

03. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma indicação de Terapia Substitutiva Renal (TSR) em pacientes graves.

- (A) Acidose metabólica.
- (B) Hipercalemia.
- (C) Hipovolemia refratária a diuréticos.
- (D) Uremia.
- (E) Intoxicação por drogas ou álcoois dialisáveis.

04. Em relação às modalidades de Terapia Substitutiva Renal (TSR) na Terapia Intensiva, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Diálise peritoneal é um procedimento cada vez mais frequente nas unidades de terapia intensiva.
- () O princípio de transporte na hemodiálise baseia-se na difusão passiva de solutos por uma membrana semipermeável.
- () Hipotensão, hemólise, embolia gasosa e síndrome do desequilíbrio são complicações que podem ocorrer durante as TSRs.
- () Fístula arteriovenosa e enxerto arteriovenoso são exemplos de acessos vasculares temporários amplamente utilizados na terapia intensiva.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

05. Choque é a incapacidade do sistema circulatório de fornecer sangue suficiente para atender às demandas de oxigênio e nutrientes dos tecidos do corpo. Com base nessa informação, considere as intervenções de enfermagem abaixo.

I - Avaliar a presença de sangramento nas incisões cirúrgicas e locais de drenos.

II - Avaliar nível de consciência.

III- Avaliar perfusão tecidual e da pele.

Quais devem ser realizadas em casos de choques?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

06. A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 306, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Em relação ao descarte dos perfurocortantes, identificados como resíduos do grupo E, é correto afirmar que

- (A) devem ser descartados em recipientes flexíveis, favoráveis à punctura e ao vazamento e com tampa.
- (B) é permitido o esvaziamento dos recipientes de descarte para seu reaproveitamento.
- (C) devem ser descartados separadamente e imediatamente após o uso.
- (D) as agulhas descartáveis devem ser reencapadas antes do descarte.
- (E) os recipientes de descarte devem atingir o preenchimento total de sua capacidade.

07. As ações de enfermagem ao paciente séptico incluem certificar-se de que a administração de antibióticos é efetuada _____ após o reconhecimento da sepse e _____ de culturas para análise laboratorial. O _____ da administração de antibiótico diminui a taxa de mortalidade nos pacientes com sepse.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) na segunda hora – após a coleta – início precoce
- (B) na primeira hora – após a coleta – início precoce
- (C) na terceira hora – entre as amostras de coleta – início tardio
- (D) na primeira hora – antes da coleta – início precoce
- (E) na segunda hora – antes da coleta – início tardio

08. A sepse resulta de um processo infeccioso e representa a resposta sistêmica à infecção. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo.

- I - Os fatores de risco para desenvolvimento da sepse são diversos e incluem desnutrição, imunossupressão e presença de dispositivos invasivos.
- II - O papel do profissional de enfermagem em terapia intensiva é contribuir na prevenção de infecções, e a lavagem de mãos ainda é um método pouco eficaz para atingir este objetivo.
- III- Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, profilaxia da trombose venosa profunda e da hemorragia digestiva são ações importantes na prevenção da sepse.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

09. Em relação aos cuidados com a sonda nasointestinal, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se verificar a localização da sonda enteral após o início da administração da dieta.
- (B) A infusão da dieta enteral deve ser feita preferencialmente por meio de sistema aberto.
- (C) A troca do sistema de administração da dieta (equipos e frasco) deve ocorrer, no máximo, a cada 72 horas.
- (D) É necessário lavar a sonda enteral nos intervalos entre as administrações de medicamento.
- (E) A dieta deve estar em temperatura ambiente e sua infusão deve ser rápida.

10. O balão intra-aórtico (BIA) presta assistência cardíaca, melhorando a oferta de oxigênio do miocárdio e reduzindo a carga de trabalho do coração. É inserido por via percutânea ou por uma incisão cirúrgica na artéria femoral. Sobre os cuidados relacionados ao uso do BIA, considere as afirmações abaixo.

- I - É necessário monitorar o sensório do paciente e a condição circulatória do membro onde está inserido o cateter.
- II - Deve-se manter a cabeceira do leito elevada acima de 45°, a fim de evitar oclusão do cateter.
- III- Deve-se verificar o local de inserção do cateter a cada duas horas, avaliando sangramentos ou formação de hematomas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

11. A cardioversão externa é um procedimento realizado para cessar as taquicardias ventricular e supraventricular, em geral quando associadas à instabilidade hemodinâmica. Em relação aos cuidados necessários para esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) O cardioversor deve estar no modo sincronizado.
- (B) O paciente deve ser mantido acordado para avaliação do nível de consciência.
- (C) Não há necessidade de manter os eletrodos para a monitorização.
- (D) A não utilização de gel de condução nas pás no momento do choque não acarreta prejuízo.
- (E) Somente poderá ficar encostado à cama do paciente o profissional que administrará o choque.

12. Sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Deve-se manter a cabeceira a 30° e realizar higiene oral com solução de clorexidina.
- () Deve-se controlar, no pós-operatório imediato, a cada 24h, os débitos dos drenos pleural e mediastinal, registrando seu aspecto e comunicando à equipe.
- () Deve-se verificar e observar a presença de alterações do ritmo e frequência cardíaca, visto que é comum no pós-operatório a ocorrência de fibrilação atrial.
- () Deve-se controlar a diurese rigorosamente, comunicando à equipe débito urinário menor que 0,5mL/kg/h.
- () Deve-se realizar curativo na ferida operatória e na inserção dos drenos a cada 48h, avaliando seu aspecto e comunicando sinais de infecção.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) F – F – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – V.
- (E) V – F – F – V – F.

13. Paciente, 64 anos de idade, recebeu prescrição de vancomicina 500mg, a ser administrada por via endovenosa. O referido paciente é portador de insuficiência renal, com indicação de restrição hídrica. Considerando que a concentração máxima de vancomicina para infusão é de 10mg/mL, assinale a alternativa que indica o volume de soro recomendado para essa diluição.

- (A) 250mL.
- (B) 50mL.
- (C) 100mL.
- (D) 500mL.
- (E) 150mL.

14. Paciente é internado na UTI em pós-operatório de drenagem de hemorragia intracraniana, com instalação de derivação ventrículo externa (DVE) e monitorização da pressão intracraniana (PIC). Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos cuidados de enfermagem para este paciente.

- (A) O estado neurológico do paciente deve ser avaliado com frequência.
- (B) O manejo da pressão arterial do paciente deve se basear nos valores da pressão da perfusão cerebral, a fim de mantê-la adequada.
- (C) A cabeça e o pescoço do paciente devem ser mantidos em posição neutra, evitando flexão, hiperextensão ou rotação.
- (D) Quando houver alteração na altura da cabeceira do paciente, é necessário o fechamento da DVE para evitar drenagem não desejada de liquor.
- (E) Os cuidados de enfermagem podem ser realizados independentemente dos valores de PIC, visto que estímulos externos não a elevam.

15. Em relação às manobras de ressuscitação cardiovascular para parada cardiopulmonar em assistolia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Um ciclo de ressuscitação equivale a 30 compressões, seguidas de duas ventilações para pacientes sem via aérea invasiva.
- (B) A droga vasopressora de escolha é a adrenalina, que pode ser repetida a intervalos de três ou cinco minutos.
- (C) O choque deve ser administrado pelo médico que está atendendo a intercorrência, e a carga selecionada deve ser de 200J para desfibrilador bifásico.
- (D) As compressões torácicas devem ser em torno de 100 por minuto.
- (E) A cada dois minutos de manobras compressivas, deve-se revezar o profissional, a fim de evitar a fadiga do mesmo e para a verificação do pulso do paciente.

16. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os fármacos aos respectivos mecanismos de ação.

- (1) Nitroglicerina
 - (2) Nitroprussiato
 - (3) Noradrenalina
 - (4) Adrenalina
- () Vasopressor usado em parada cardiopulmonar.
() Vasodilatador venoso usado no tratamento da fase aguda da angina.
() Vasopressor que causa necrose cutânea se ocorrer extravasamento de adrenalina.
() Vasodilatador usado em crises hipertensivas.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 1 – 4 – 3 – 2.
- (C) 4 – 3 – 2 – 1.
- (D) 3 – 2 – 4 – 1.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

17. A principal desvantagem do oxímetro de pulso, na avaliação do estado de oxigênio, é que sua precisão depende de um sinal arterial adequado. Com base nessa informação, considere as situações clínicas abaixo.

- I - Vasoconstrição ou uso de medicamentos vasoativos.
- II - Estado de baixo débito cardíaco.
- III - Hipotermia.

Quais diminuem a precisão do oxímetro?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. A manutenção das vias respiratórias pérvias é um aspecto importante do manejo em terapia intensiva. Com relação aos cuidados de enfermagem indicados no procedimento de aspiração, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Durante a aspiração, deve-se fornecer hiperoxigenação com O₂ a 60% a cada introdução da sonda.
- () A duração de cada introdução de sonda de aspiração deve ser de, no máximo, 10 segundos.
- () Deve-se instilar de 5mL a 10mL de solução salina fisiológica durante a aspiração do tubo endotraqueal.
- () Quando houver diminuição na SaO₂, durante a aspiração, deve-se usar sistema de aspiração fechado.
- () Deve-se utilizar técnica asséptica para aspiração de via aérea artificial.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) V – F – F – V – F.

19. A pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é uma infecção do pulmão causada por bactérias, vírus ou fungos em pacientes em ventilação mecânica por mais de 48 horas após intubação endotraqueal. Sobre cuidados de enfermagem de prevenção de PAVM, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se trocar o circuito do ventilador do paciente uma vez por semana.
- (B) Deve-se aspirar somente quando clinicamente indicado e nunca de modo rotineiro.
- (C) Deve-se realizar higiene oral com clorexidina.
- (D) Deve-se usar, preferencialmente, sistema de aspiração traqueal fechado.
- (E) Deve-se manter adequada a pressão do balonete.

20. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um cuidado necessário à prevenção de infecção urinária associada a cateter vesical.

- (A) Promover técnica asséptica na inserção do cateter vesical.
- (B) Desconectar a bolsa coletora quando houver suspeita de obstrução.
- (C) Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, a fim de evitar refluxo de urina.
- (D) Fixar a sonda de forma a não tracionar e não lesionar a pele do paciente.
- (E) Utilizar dispositivo e luvas exclusivos para cada paciente, ao desprezar a diurese da bolsa coletora.

21. Sobre o uso de vasopressores, assinale a alternativa correta.

- (A) Vasopressores são utilizados quando o paciente se apresenta hemodinamicamente estável.
- (B) A infusão de qualquer droga vasoativa pode ser feita por via endovenosa ou intramuscular.
- (C) O uso exagerado de vasopressores pode aumentar o trabalho do ventrículo e prejudicar a perfusão dos órgãos.
- (D) A adrenalina é considerada droga de primeira linha para manutenção da pressão sanguínea e perfusão tecidual.
- (E) A administração de vasopressores não requer uso de bomba de infusão contínua.

22. A prevenção e o tratamento das úlceras por pressão (UPs) constituem um grande desafio para a enfermagem em unidades de terapia intensiva. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo.

- I - A idade avançada é fator de risco para desenvolvimento de UP, pois a pele torna-se mais frágil em virtude da lentidão da renovação da epiderme e da diminuição da vascularização.
- II - A escala de Braden avalia risco de desenvolvimento de úlcera por pressão.
- III- A incontinência urinária pode causar mais lesões cutâneas do que a fecal, pois aumenta a exposição do paciente à umidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os estágios da úlcera por pressão às suas respectivas características.

- (1) Estágio I
 - (2) Estágio II
 - (3) Estágio III
 - (4) Estágio IV
- () Perda total da pele, com destruição do tecido, atingindo músculo, ossos ou estruturas de suporte (tendões e cápsula articular).
 - () Eritema em pele íntegra, calor, edema e endurecimento.
 - () Ferida de espessura parcial da pele, envolvendo epiderme e/ou derme, que se manifesta como abrasão, bolha ou cratera rasa.
 - () Ferida de espessura completa, com lesão tecidual ou necrose do tecido subcutâneo que pode atingir a fáscia, mas não se desenvolve além dela.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 1 – 4 – 3 – 2.
- (C) 4 – 1 – 2 – 3.
- (D) 4 – 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 1 – 4 – 2.

24. O fígado desempenha papel central no metabolismo do corpo. Com relação ao funcionamento do fígado, considere as afirmações abaixo.

- I - Entre as complicações mais comuns da insuficiência hepática, estão a encefalopatia hepática e a peritonite bacteriana espontânea.
- II - A principal causa da insuficiência hepática aguda é a overdose por anti-inflamatórios.
- III- As varizes esofágicas ocorrem devido à hipertensão arterial e devido à alteração do metabolismo de gorduras.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

25. Sobre o processo de transfusão de hemocomponentes, assinale a alternativa correta.

- (A) A infusão de sangue é compatível com solução fisiológica 0,9% ou Ringer lactato.
- (B) A unidade de sangue pode ser aquecida por imersão em água quente ou com aparelho de micro-ondas.
- (C) Após o início da infusão, deve-se realizar observação direta do paciente por um a dois minutos, comunicando alterações.
- (D) A administração de hemocomponente em um paciente febril não é recomendada.
- (E) O tempo de infusão do concentrado de hemácias deve ser de aproximadamente uma hora, não devendo exceder seis horas.

26. Na perspectiva do Programa Nacional de Humanização, "Familiar Participativo" é

- (A) um indivíduo representado unicamente por familiares ascendentes ou descendentes.
- (B) um representante da rede social do usuário que garante a articulação entre a rede social/familiar e a equipe profissional do serviço de saúde.
- (C) um grupo de pessoas próximas ao usuário que se dispõe a fazer a articulação junto aos profissionais e a instituição.
- (D) um único familiar ou representante nomeado judicialmente.
- (E) um indivíduo representado pela pessoa/familiar que promoveu o encaminhamento ou internação do usuário, assumindo a responsabilidade pela escolha da instituição.

27. Qual princípio ético afirma a obrigação de prevenir e remover danos, promovendo o bem, ajudando outros a progredir e a realizar seus interesses?

- (A) Autonomia.
- (B) Justiça.
- (C) Beneficência.
- (D) Privacidade.
- (E) Paternalismo.

28. O processo de extensão de cobertura dos serviços de saúde, de modo que, paulatinamente, se tornem acessíveis a toda população, denomina-se

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Descentralização.
- (E) Regionalização.

29. Em relação à autonomia do paciente para tomar decisões a respeito de seu tratamento, considere os itens abaixo.

- I - Capacidade de compreender, comunicar, formar e expressar uma preferência.
- II - Orientação em relação ao tempo e espaço.
- III - Saúde física e mental e capacidade de ser coerente em relação às questões.

Quais são aspectos relevantes para a autonomia do paciente na tomada de decisões no que se refere ao seu tratamento?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

30. Para a implementação de uma cultura de segurança, é necessário

- (A) estabelecer relações seguras, restritivas e pouco flexíveis.
- (B) examinar as possibilidades individualmente, apenas junto aos envolvidos.
- (C) buscar as soluções em equipe e horizontalmente.
- (D) desencorajar discussões e documentar erros.
- (E) deixar claro a todos que segurança nem sempre é possível.

31. O processo de trabalho da equipe de enfermagem está associado a altos níveis de ocorrências de agravos, caso não existam medidas rigorosas por parte das instituições no sentido de prevenir essas ocorrências. Assinale a alternativa que apresenta uma medida importante na proteção à saúde do trabalhador.

- (A) Normas e rotinas definidas que auxiliem a fragmentação do trabalho.
- (B) Uso correto de equipamentos de proteção individual.
- (C) Trocas diárias de turno e local de trabalho.
- (D) Reduzida participação do trabalhador nos processos decisórios que envolvem suas práticas profissionais.
- (E) Redução do espaço físico da área de trabalho para evitar quedas.

32. Qual, dentre as alternativas abaixo, apresenta efeitos colaterais resultantes da farmacologia com opioides?

- (A) Náuseas e vômitos, prurido, constipação.
- (B) Depressão respiratória, diarreia, prurido.
- (C) Retenção urinária, tremores, constipação.
- (D) Constipação, insônia, cefaleia.
- (E) Prurido, tremores, diarreia.

33. Sobre prevenção de erros na administração de medicamentos, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Medicamentos de alto risco são aqueles que possuem maior potencial para causar danos ao paciente, quando há falha em sua utilização.
- () A administração de um medicamento em dose maior ou menor do que a prescrita constitui-se em um erro de dispensação.
- () O sistema de medicação tem três fases distintas: prescrição, preparo e administração.
- () Hidrólise e oxidação são reações químicas irreversíveis que podem ocasionar a instabilidade entre medicamentos.
- () Na vigência de erro, é importante identificar de imediato quem o ocasionou, para que sejam tomadas as devidas providências.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – F – F – V – F.

34. Com relação ao processo de administração de medicamentos, os profissionais de enfermagem precisam estar atentos a alguns cuidados. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um desses cuidados.

- (A) Preparar o material necessário e higienizar as mãos antes e após a administração de medicamentos.
- (B) Conferir informações do paciente: nome, idade, registro, alergias e sinais vitais.
- (C) Utilizar etiquetas ou rótulos nos medicamentos preparados com os mesmos identificadores do paciente e com dados completos do medicamento.
- (D) Registrar no prontuário todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, como adiamento, cancelamento, desabastecimento e recusa do paciente.
- (E) Ao término de cada turno de trabalho, checar sempre, na prescrição médica, os medicamentos administrados.

35. Os drenos torácicos costumam ser usados em pacientes graves para drenar _____, _____ ou fluido do espaço _____ ou do _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) ar – secreção – pleural – interstício
- (B) ar – sangue – pleural – mediastino
- (C) sangue – empiema – pleural – tórax
- (D) ar – sangue – alveolar – tórax
- (E) sangue – empiema – torácico – mediastino

36. Considere as afirmações abaixo sobre morte encefálica e potencial doador.

- I - O diagnóstico de morte encefálica é definido como parada irreversível das funções do encéfalo.
- II - O exame clínico neurológico, que detecta a ausência de função encefálica, pode ser realizado uma única vez.
- III- Sepse ativa, tuberculose e uso de drogas ilícitas por via venosa não são contra-indicações à doação de órgãos e tecidos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

37. Considere as afirmações abaixo sobre prevenção de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC).

- I - Devem-se higienizar as mãos antes de manusear o cateter venoso central.
- II - Deve-se revisar semanalmente o sítio de inserção do cateter quanto a sangramento, hematoma, secreção ou infiltração.
- III- A desinfecção das conexões do cateter deve ser feita com gaze embebida em álcool 70%.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

38. As _____ dos profissionais de saúde podem adquirir microrganismos multirresistentes por meio do contato com pacientes colonizados ou infectados por esses agentes e também pelo contato com _____ ou _____ próximas ao paciente. Os microrganismos multirresistentes podem, então, se tornar parte da microbiota transitória da pele, sendo facilmente removidos por _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) vestimentas – meio ambiente – roupas – higienização das mãos
- (B) mãos – equipamentos – superfícies – uso de luvas
- (C) luvas – meio ambiente – ferramentas – uso de luvas
- (D) vestimentas – roupas – superfícies – higienização das mãos
- (E) mãos – meio ambiente – superfícies – higienização das mãos

39. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as terminologias aos seus respectivos conceitos.

- (1) Segurança do paciente
 - (2) Erro de medicação
 - (3) Evento adverso relacionado a medicamentos
 - (4) Reação adversa a medicamento
 - (5) Erro potencial
- () Iniciativa para evitar, prevenir e reduzir resultados adversos ocorridos a partir do cuidado à saúde.
- () Qualquer dano ou injúria causados ao paciente pela intervenção médica relacionada a medicamentos, provocados pelo uso ou falta de uso, quando necessários.
- () Qualquer evento evitável, causado pelo uso inadequado de medicações.
- () Evento ou situação que poderia resultar em acidente, injúria ou doença, mas é interceptado a tempo.
- () Efeito prejudicial ou indesejado que ocorre após a administração de um medicamento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (B) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
- (C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- (D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- (E) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.

40. As medidas para a segurança do paciente propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) têm por finalidade demonstrar quais projetos ou intervenções apresentam a propriedade de prevenir ou amainar eventos adversos e danos aos pacientes, decorrentes dos processos de cuidados à saúde.

Considere as medidas abaixo.

- I - Prevenir queda do paciente.
- II - Prevenir úlceras por pressão.
- III- Distinguir medicamentos com nome e pronúncia semelhantes.

Quais são medidas propostas pela OMS para prevenir danos ao paciente?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 04/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 51

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Centro de Tratamento Intensivo)

01.	E	11.	A	21.	C	31.	B
02.	D	12.	B	22.	D	32.	A
03.	C	13.	B	23.	C	33.	E
04.	A	14.	E	24.	A	34.	E
05.	E	15.	C	25.	D	35.	B
06.	C	16.	A	26.	B	36.	A
07.	B	17.	E	27.	C	37.	D
08.	D	18.	B	28.	A	38.	E
09.	D	19.	A	29.	D	39.	B
10.	D	20.	B	30.	C	40.	E



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 04/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 53 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Hemodiálise)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Em relação aos momentos de higienização das mãos preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), durante o atendimento do paciente em hemodiálise, considere as afirmações abaixo.

- I - Deve-se higienizar as mãos antes de puncionar o paciente.
- II - Deve-se higienizar as mãos após o contato com sangue do paciente.
- III - Deve-se higienizar as mãos após alterar o fluxo de sangue na máquina de hemodiálise.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

02. Os solutos que conseguem atravessar os poros da membrana do dialisador durante a hemodiálise são transportados por meio de dois mecanismos diferentes. Assinale a alternativa que apresenta esses mecanismos.

- (A) Osmose e ultrafiltração.
- (B) Concentração e difusão.
- (C) Difusão e convecção.
- (D) Osmose e difusão.
- (E) Hemofiltração e osmose.

03. Em relação às recomendações específicas para caso de suspeita ou infecção confirmada por *Clostridium difficile*, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O uso de luvas e aventais é obrigatório para o profissional, após a entrada no quarto do paciente.
- (B) É obrigatória a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, após o contato com o paciente ou com o ambiente em que este se encontra.
- (C) O paciente deverá ser mantido, por precaução, isolado de contato, em quarto individual ou coorte, até 48 horas após o término da diarreia.
- (D) Deve-se retirar primeiramente o avental e, a seguir, as luvas, imediatamente após a utilização.
- (E) Deve-se evitar o transporte do paciente. Quando for necessário, o profissional deve utilizar luvas e aventais descartáveis durante o transporte.

04. Em relação à Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 11, de 13/03/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () É obrigatória, ao final de cada dia, a limpeza e desinfecção da máquina de hemodiálise e das superfícies que entram em contato com o paciente.
- () Os pacientes recém admitidos no programa de tratamento dialítico, com sorologia desconhecida para hepatite B, devem ser assistidos por profissional exclusivo durante todo o procedimento hemodialítico, em máquinas específicas para esse tipo de tratamento.
- () É vedado o reuso de dialisadores de pacientes com sorologias positivas para hepatite B, hepatite C (tratados ou não) e HIV.
- () O registro da utilização de um novo dialisador deve ser assinado pelo paciente e mantido no prontuário do mesmo.
- () As características físicas e organolépticas da água potável para diálise devem ser verificadas semanalmente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) F – V – V – V – F.
- (E) V – F – V – F – V.

05. Em relação às orientações ao paciente, quanto aos cuidados com a fístula arteriovenosa (FAV), assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Deve-se verificar semanalmente o funcionamento da FAV, por meio de palpação do frêmito.
- () Deve-se lavar o braço da FAV, imediatamente antes de sua punção, na unidade de hemodiálise.
- () Deve-se evitar o uso de roupas apertadas, de relógios e pulseiras, assim como carregar peso com o braço da FAV ou deitar sobre o mesmo.
- () Deve-se retirar os curativos dos locais das punções 12 horas após o término da sessão de hemodiálise.
- () Em caso de sangramento na FAV, deve-se realizar curativo compressivo, circular, somente no local do sangramento.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
- (B) V – V – F – V – V.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) V – F – F – F – V.

06. Com relação à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, considere as afirmações abaixo.

- I - As ações e serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma centralizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- II - O direito das pessoas à informação sobre sua saúde e a participação da comunidade no sistema de saúde estão entre os princípios do SUS.
- III- A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- IV - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

07. Com relação às funções dos rins, considere as afirmações abaixo.

- I - Sintetizam hormônios como a eritropoetina e a forma ativa da vitamina D.
- II - Mantêm constante o volume extracelular.
- III- Regulam a pressão arterial sistêmica.
- IV - Produzem linfócitos T.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

08. Assinale a alternativa que apresenta o acesso permanente ideal para hemodiálise, facilitando o fluxo de sangue adequado e apresentando baixa taxa de complicação.

- (A) Enxerto arteriovenoso.
- (B) Cateter de dupla luz de curta permanência.
- (C) Fístula arteriovenosa autóloga.
- (D) Cateter de tripla luz.
- (E) Cateter de longa permanência tunelizado.

09. Considere a RDC nº 11, da ANVISA, de 13/03/2014. Assinale a alternativa correta com relação à permissão de reuso de dialisadores e linhas arteriais e venosas.

- (A) Quando há indicação na rotulagem de "proibido reprocessar".
- (B) Quando não possuem capilares com membrana biocompatível.
- (C) Quando utilizados em pacientes com sorologias desconhecidas para Hepatite B, C e HIV.
- (D) Quando utilizados em pacientes, independentemente das sorologias.
- (E) Quando utilizados em pacientes com sorologias conhecidas e negativas para Hepatite C, B e HIV.

10. A diálise peritoneal (DP) e suas variações são modalidades de diálise que usam o peritônio como membrana semipermeável para a depuração de toxinas urêmicas. As técnicas contínuas desse tipo de diálise, que podem ser manuais ou automatizadas, preconizam que o paciente esteja com líquido na cavidade peritoneal nas 24 horas do dia.

Com relação a essas técnicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Na diálise peritoneal ambulatorial contínua, utiliza-se quatro trocas por dia, de um litro de volume.
- (B) Na diálise peritoneal ambulatorial contínua, utiliza-se uma máquina cicladora, geralmente à noite.
- (C) A diálise peritoneal ambulatorial contínua e a diálise peritoneal automatizada são realizadas durante o dia e consistem em quatro trocas com dois litros de volume.
- (D) Na diálise peritoneal automatizada, utiliza-se uma máquina cicladora, geralmente à noite.
- (E) Na diálise peritoneal automatizada, utiliza-se quatro trocas por dia, com dois litros de volume.

11. A concentração de sódio no dialisato é de aproximadamente 140mEq/L. As consequências de um dialisato com concentrações maiores estão associadas

- (A) à hipotensão e a câimbras.
- (B) à hipotensão e à sede aumentada.
- (C) ao excessivo ganho de peso interdialítico e à hipotensão.
- (D) à sede aumentada e a câimbras.
- (E) ao excesso de ganho de peso interdialítico e à sede aumentada.

12. As manifestações clínicas nos indivíduos com Doença Renal Crônica (DRC) são fundamentais para a complementação do diagnóstico final do paciente. Essas manifestações são caracterizadas por _____ ou _____, e ocorrem em função de _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas do parágrafo acima.

- (A) síndrome urêmica – uremia – retenção de escórias nitrogenadas
- (B) uremia – síndrome urêmica – hiperpotassemia
- (C) hipertensão arterial – edema – acúmulo de sal
- (D) uremia – hiperpotassemia – retenção de escórias nitrogenadas
- (E) hipertensão arterial – edema – anúria

13. Câimbras musculares são uma complicação frequente na hemodiálise. Assinale a alternativa que apresenta os fatores predisponentes mais importantes para esse tipo de complicação em sua etiologia.

- (A) Hipotensão arterial, uso de solução dialítica pobre em cálcio e hipopotassemia.
- (B) Hipotensão arterial, uso de solução dialítica pobre em sódio e hiperpotassemia.
- (C) Paciente abaixo do peso seco, uso de solução dialítica rica em sódio e paciente com hipopotassemia.
- (D) Hipotensão arterial, paciente abaixo do peso seco e uso de solução dialítica pobre em sódio.
- (E) Uso de solução dialítica pobre em sódio e sem glicose, hipotensão arterial e paciente acima do peso seco.

14. A osmose reversa é um sistema que, por meio de uma membrana semipermeável, realiza a purificação da água para que fique em melhores condições para a realização da hemodiálise. Recomenda-se a periodicidade _____ para a limpeza e a desinfecção do reservatório da água tratada; para o controle de qualidade físico-químico dessa água é recomendada a periodicidade _____. O controle microbiológico é feito por laboratório habilitado e deve ser realizado com periodicidade _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) quinzenal – semanal – mensal
- (B) mensal – diária – mensal
- (C) mensal – diária – quinzenal
- (D) quinzenal – semanal – diária
- (E) mensal – semanal – quinzenal

15. Considere os itens abaixo referentes às indicações absolutas para a realização da diálise na Insuficiência Renal Aguda (IRA).

- I - Congestão pulmonar por insuficiência cardíaca refratária ao tratamento medicamentoso.
- II - Hipervolemia associada a dificuldade ventilatória ou edema cerebral, não tratável com o uso de diuréticos.
- III- Serosite urêmica (especialmente pericardite) e encefalopatia urêmica.
- IV- Oligúria (<200mL/12h) ou anúria (<50mL/12h).

Quais são indicações absolutas para realização de diálise?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

16. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os cuidados de enfermagem ao paciente com fístula arteriovenosa (FAV) à prevenção de complicações.

- (1) Puncionar o ramo arterial, mantendo, no mínimo, 3cm de distância da anastomose.
 - (2) Alternar os locais de punção.
 - (3) Fazer antisepsia do local a ser puncionado.
 - (4) Evitar a punção prematura da fístula, por aproximadamente 20 a 30 dias.
 - (5) Evitar o garroteamento prolongado do braço da FAV mesmo quando da punção para a hemodiálise.
- () previne infecção
 - () previne infecção do acesso e formação de aneurisma
 - () evita trombose e formação de aneurisma
 - () evita extravasamento de sangue e hematoma
 - () evita hematoma e trombose do acesso

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- (B) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
- (C) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- (D) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4.

17. O acesso vascular é de importância vital ao paciente com insuficiência renal crônica. Portanto, cuidados com o acesso são uma preocupação constante da equipe multiprofissional, do paciente e da família (Barros, 2006). Assinale a alternativa que contém a orientação correta, no que se refere a esses cuidados para um paciente com cateter duplo lúmen.

- (A) Trocar o curativo, em casa, sempre que este estiver molhado.
- (B) Dormir sobre o cateter para que fique bem fixado.
- (C) Se apresentar febre, usar medicamentos conforme orientação médica e aguardar até o dia da diálise para avaliação.
- (D) Proteger o cateter com material impermeável durante o banho e evitar manipulação, mantendo-o fixo com fita adesiva.
- (E) Se o paciente apresentar dor e sangramento na inserção do cateter, administrar analgésicos, conforme prescrição médica, e manter o curativo limpo para evitar infecções.

18. As complicações que ocorrem durante a sessão de hemodiálise podem ser extremamente graves e fatais. É importante a atuação da equipe de enfermagem na observação contínua dos pacientes durante a sessão. (Fermi, 2011). Assinale a alternativa correta, com relação às complicações que podem ocorrer durante a realização da hemodiálise.

- (A) A hemólise pode ser causada por um rolete da bomba de sangue desregulado.
- (B) Sempre que um paciente apresentar câimbras, deve-se aumentar seu peso seco.
- (C) Náuseas e vômitos estão sempre associados à ingestão de alimentos durante a sessão dialítica.
- (D) A hipotensão postural pode ocorrer por níveis altos de sódio.
- (E) Febre e calafrios são comuns, devido à qualidade da água para diálise.

19. Com relação às estratégias que ajudam a evitar a hipotensão durante a diálise, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se aconselhar o paciente a limitar o consumo de sal.
- (B) Deve-se reavaliar o peso seco do paciente.
- (C) Não se deve administrar anti-hipertensivos antes da diálise.
- (D) Deve-se diminuir o tempo de diálise.
- (E) Deve-se privar os pacientes propensos à hipotensão de alimentos ou glicose via oral.

20. Assinale a alternativa correta quanto às complicações durante a hemodiálise.

- (A) O prurido em pacientes com insuficiência renal crônica é tratado apenas com carbonato de cálcio.
- (B) A cefaleia durante a hemodiálise ocorre devido à Síndrome do Desequilíbrio, e o tratamento é diminuir o tempo de diálise.
- (C) As náuseas e os vômitos estão relacionados com a hipotensão arterial, mas podem também ser uma manifestação da Síndrome do Desequilíbrio.
- (D) Câimbras ocorrem, na maioria das vezes, em função da hipertensão.
- (E) Convulsões não são comuns nos pacientes em diálise. Quando ocorrem, deve-se baixar o fluxo de diálise e deve ser instalado oxigênio.

21. Com relação à anticoagulação em hemodiálise, segundo Fermi, 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) A diálise sem anticoagulante é indicada apenas para paciente com hemorragia ativa.
- (B) A técnica de diálise sem heparina consiste em preencher todo o circuito com soro fisiológico, adicionar 5000U/heparina (1mL) no sistema e desprezar todo o *priming* antes da diálise, conforme prescrição médica.
- (C) O maior problema de se realizar uma sessão de hemodiálise sem anticoagulante é o volume de lavagem que deve ser acrescentado.
- (D) Fluxo sanguíneo reduzido, hematócrito baixo e transfusão durante a sessão de hemodiálise são fatores que favorecem a coagulação do sistema.
- (E) Pacientes com pericardite e derrame pericárdico podem receber heparina reduzida para evitar coagulação do sistema.

22. Assinale a alternativa correta em relação a soluções de hemodiálise.

- (A) As soluções de hemodiálise têm composição padrão para todos os pacientes.
- (B) O nível de cálcio, na solução de hemodiálise, é de 3,5. Níveis inferiores a 3,0 podem predispor o paciente à hipotensão arterial, e níveis elevados podem aumentar risco de arritmias.
- (C) A grande maioria dos pacientes está constantemente com níveis de potássio elevado, razão pela qual as soluções de hemodiálise não contêm potássio.
- (D) As soluções de hemodiálise são compostas de uma solução básica e de água purificada.
- (E) Pacientes diabéticos devem dialisar com soluções sem dextrose.

23. Paciente em pós-operatório imediato de transplante renal está na sala de recuperação sob os cuidados do técnico de enfermagem. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto aos cuidados que devem ser tomados por esse profissional.

- (A) Observar nível de consciência, alteração respiratória e cianose de extremidades.
- (B) Avaliar a dor e o risco de queda.
- (C) Controlar volume urinário e reposição de hidratação volêmica, conforme prescrição médica.
- (D) Restringir visitas.
- (E) Manter cabeceira do paciente elevada a 40°.

24. Paciente de 54 anos de idade realiza sessão de hemodiálise e tem prescrição de medicação ferroparenteral por via intravenosa. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à aplicação e cuidados com esse medicamento.

- (A) Deve-se administrar o medicamento lentamente, devido ao risco de hipotensão.
- (B) Deve-se descartar as sobras.
- (C) Deve-se administrá-lo sempre após o término da sessão de hemodiálise.
- (D) Não deve ser misturado com outros medicamentos.
- (E) Deve ser diluído em soro fisiológico a 0,9%.

25. Segundo Daugirdas (2010), as complicações durante o tratamento dialítico, na maioria das vezes, são preveníveis.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as complicações do tratamento às estratégias de prevenção estabelecidas.

- (1) Síndrome do desequilíbrio
 - (2) Infecções
 - (3) Embolia gasosa
 - (4) Hemólise
 - (5) Hipertensão
 - (6) Câimbras musculares
-
- () Prevenir obstrução da via do sangue.
 - () Reduzir ingestão de sódio e de líquidos pelo paciente em tratamento.
 - () Usar solução de diálise com concentração de sódio de, pelo menos, 140mM.
 - () Prevenir episódios hipotensivos.
 - () Acionar detector de ar.
 - () Usar precauções universais.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 4 – 6 – 5 – 2.
- (B) 4 – 5 – 1 – 6 – 3 – 2.
- (C) 6 – 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 1 – 6 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (E) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 – 6.



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EDITAL N.º 04/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 53

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Hemodiálise)**

01.	E	11.	E	21.	B
02.	C	12.	A	22.	B
03.	B	13.	D	23.	E
04.	D	14.	B	24.	C
05.	A	15.	C	25.	B
06.	D	16.	A		
07.	C	17.	D		
08.	C	18.	A		
09.	E	19.	D		
10.	D	20.	C		

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Segurança da informação nas empresas: diferenças entre educar, treinar e conscientizar

01 Quando se fala em segurança da informação nas empresas, ter pessoas competentes e prontas
02 para encarar ___ ameaças do dia ___ dia com esperteza e responsabilidade é a sua primeira linha
03 de defesa. O elo mais fraco de um plano de segurança é sempre o fator humano, ou seja, o
04 usuário, pois não ___ nenhuma tecnologia, nenhum tipo de software que possa impedir o deslize
05 de um funcionário desatento. Por isso, uma forte segurança da informação nas empresas depende
06 da capacitação dos colaboradores para executar suas funções de maneira, de fato, segura.

07 Nem todos os colaboradores, contudo, precisam ter o mesmo nível de conhecimento de
08 segurança, o que torna fundamental que se entenda a diferença entre educação, treinamento e
09 conscientização. Para isso, vamos promover uma analogia. A maior parte das pessoas que você
10 conhece provavelmente gosta de ir à praia. De fato, é uma atividade muito comum para muitas
11 pessoas e que exige diversos cuidados: passar filtro solar, manter-se hidratado, e, principalmente,
12 ter atenção ao mar. Quem nunca foi à praia ou não convive com esse ambiente de forma habitual
13 pode não entender como o mar é – além de muito atrativo – perigoso. Talvez essa pessoa também
14 não saiba quais são os cuidados a serem tomados, de modo que pode acabar correndo riscos
15 desnecessários. Já alguém que esteja mais habituado e conheça ao menos um pouco sobre os
16 perigos de um mar revolto sabe o que significa a bandeira vermelha, e, idealmente, sabe
17 identificar quando é seguro se divertir e se refrescar nas ondas e quando é melhor se manter na
18 segurança da areia. Essa pessoa que tem uma noção sobre como se relacionar com o mar é uma
19 pessoa que tem consciência sobre os perigos que **ele** pode apresentar e como identificá-los.
20 Conscientização, portanto, é um estado constante de estar ciente das ameaças que existem, como
21 identificá-las e como evitar ser uma vítima.

22 Do ponto de vista da segurança da informação nas empresas, um colaborador plenamente
23 conscientizado conhece as boas práticas para não se encontrar no centro de um incidente de
24 vazamento de informações. **Ele** sabe como se prevenir contra ameaças de hackers, bem como
25 identificar o perigo em potencial, mesmo que não entenda todos os detalhes por trás de cada
26 prática de cunho deletério a sua atividade profissional.

27 Quando falamos de segurança da informação, alguém não conscientizado pode clicar em links
28 suspeitos, abrir anexos indesejados, tirar fotos reveladoras de algo confidencial no ambiente de
29 trabalho e até submeter credenciais em formulários fraudulentos. Cada uma dessas ações gera
30 incidentes de segurança da informação. Para lidar com determinadas ameaças e incidentes, uma
31 pessoa precisa estar treinada, seja para responder rapidamente ou até mitigar danos.
32 Treinamento, então, consiste no desenvolvimento de competências necessárias à execução de
33 uma atividade ou função. Em se tratando de segurança da informação nas empresas, alguns
34 profissionais precisam de conhecimento e competências um nível acima do alcançado com a
35 conscientização. Da mesma forma que uma pessoa pode ter sido treinada por um curso de
36 primeiros socorros ou salvamento para executar alguns passos e conter ou amenizar um incidente,
37 alguém treinado para segurança da informação saberá operar controles, técnicas, e atuar com
38 gerenciamento de risco e política de segurança.

39 A educação, por outro lado, está associada a um corpo de conhecimento formado por um
40 conjunto de competências, capacidades e entendimento teórico adequados a diversas funções.
41 Idealmente, a educação aborda conceitos, princípios e questões de maneira multidisciplinar, sob
42 vários pontos de vista e abordagens, envolvendo aspectos não só tecnológicos do assunto
43 estudado, como também sociais. As pessoas que são educadas são os profissionais e especialistas.
44 Na analogia que vínhamos tecendo, alguém que tem uma educação para lidar com incidentes na
45 praia e no mar pode ser um profissional de salvamento, como um bombeiro ou salva-vidas, ou até
46 paramédicos, em oposição a uma pessoa apenas treinada em salvamento ou primeiros socorros.

Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em:
<https://www.proof.com.br/blog/seguranca-da-informacao-nas-empresas/>.

QUESTÃO 01 – A respeito da grafia de algumas palavras localizadas no texto, levando-se em conta o seu significado no contexto da frase em que aparecem, considere as seguintes afirmações:

- I. “deslize” (l. 04) está escrita corretamente.
- II. “desnecessários” (l. 15) está escrita corretamente.
- III. “prevenir” (l. 24) está escrita incorretamente, pois o correto é “previnir”.
- IV. “trás” (l. 25) está escrita incorretamente, pois o correto é “traz”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta, ao lado da palavra retirada do texto, um termo que semanticamente a substitua de forma correta.

- A) “esperteza” (l. 02) – aspereza.
- B) “desatento” (l. 05) – desalento.
- C) “analogia” (l. 09) – aleivosia.
- D) “atrativo” (l. 13) – atraente.
- E) “deletério” (l. 26) – apagável.

QUESTÃO 03 – As linhas tracejadas situadas no primeiro parágrafo do texto são, respectiva e corretamente, preenchidas com:

- A) as – a – a
- B) às – à – a
- C) as – à – há
- D) às – a – à
- E) as – a – há

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que mostra uma palavra extraída do texto que contém apenas um encontro consonantal.

- A) empresas (l. 01).
- B) detalhes (l. 25).
- C) confidencial (l. 28).
- D) pessoa (l. 31).
- E) socorros (l. 46).

QUESTÃO 05 – Com base exclusivamente no que é expresso pelo texto, é correto afirmar que seu autor:

- A) Esclarece que os colaboradores de uma empresa, sem exceção, necessitam ter o mesmo nível de conhecimento sobre segurança da informação.
- B) Conceitua que conscientização é um estado intermitente de se ter ciência das ameaças de ataques virtuais, sendo indispensável saber identificá-las, bem como evitar ser uma vítima delas.
- C) Sustenta que um colaborador neófito em relação à segurança da informação nas empresas conhece as boas práticas para não se encontrar no centro de um incidente de vazamento de informações.
- D) Salaria que a pessoa que recebe treinamento para segurança da informação aprende a lidar profissionalmente com gerenciamento de riscos e a atuar com política de segurança da informação.
- E) Destaca que a educação aborda conceitos, princípios e questões de maneira unilateral, envolvendo aspectos tecnológicos do assunto estudado.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que contém um adjetivo que, por sua formação, é classificado como primitivo.

- A) esperteza (l. 02).
 - B) forte (l. 05).
 - C) perigoso (l. 13).
 - D) habituado (l. 15).
 - E) fraudulentos (l. 29).
-

QUESTÃO 07 – No excerto “Talvez essa pessoa também não saiba quais são os cuidados a serem tomados, de modo que pode acabar correndo riscos”, retirado do texto, se a palavra “pessoa” fosse flexionada no plural, quantas palavras ao todo precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal?

- A) Duas.
 - B) Três.
 - C) Quatro.
 - D) Cinco.
 - E) Seis.
-

QUESTÃO 08 – O termo “portanto” (l. 20), para continuar exprimindo a ideia de conclusão, pode ser substituído pelas seguintes conjunções e locuções conjuntivas:

- I. Porquanto.
- II. Assim.
- III. No entanto.
- IV. Por conseguinte.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
 - B) Apenas I e III.
 - C) Apenas II e III.
 - D) Apenas II e IV.
 - E) Apenas III e IV.
-

QUESTÃO 09 – No fragmento “Quando falamos de segurança da informação, alguém não conscientizado pode clicar em links suspeitos, abrir anexos indesejados, tirar fotos reveladoras de algo confidencial no ambiente de trabalho e até submeter credenciais em formulários fraudulentos” retirado do texto, as duas últimas vírgulas foram empregadas para separar:

- A) Elementos paralelos de um provérbio.
 - B) Conjunções pospositivas.
 - C) Orações justapostas assindéticas.
 - D) Adjuntos adverbiais.
 - E) Expressões retificativas.
-

QUESTÃO 10 – Em “O elo mais fraco de um plano de segurança é sempre o fator humano”, retirado do texto, a forma verbal “é”, quanto a sua predicação, assinala a presença, na referida frase, de um verbo:

- A) Intransitivo.
 - B) Bitransitivo.
 - C) Transitivo direto.
 - D) Transitivo indireto.
 - E) De ligação.
-

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

A vida em um dia

01 Um inusitado projeto pediu para que pessoas do mundo todo enviassem vídeos em que
02 contassem sua vida em um dia. O retorno a esse apelo veio na forma de nada menos que 4500
03 horas de imagens registradas por pessoas de mais de 190 nacionalidades. Trata-se de *A vida em*
04 *um dia*, documentário produzido a partir da parceria entre a plataforma de compartilhamento de
05 vídeos YouTube, o diretor Kevin Macdonald e os produtores Ridley e Tony Scott.

06 Pensado a partir de uma ideia simples (conte-nos um dia de sua vida e faça parte de nosso
07 filme), *A vida em um dia* é também um filme simples, porém capaz de levantar algumas reflexões.
08 Editado em ordem cronológica, o documentário mostra pessoas acordando, escovando os dentes,
09 tomando café da manhã, saindo de casa para o trabalho, fazendo o almoço etc., conseguindo
10 captar o que de mais forte há na vida das pessoas: o cotidiano. Por ser tão simplório, à primeira
11 vista o filme pode parecer apenas um compilado de vídeos do YouTube, intercalados com trailers
12 de bons dramas que jamais chegaremos a ver. São cenas simples do cotidiano intercaladas com
13 passagens que se sobressaem (como a do jovem que anuncia sua homossexualidade pelo telefone
14 para a sua avó, ou a cena que se passa em um lar desorganizado e mostra o hábito de um pai
15 viúvo e seu filho pequeno saudarem a imagem da falecida esposa/mãe às manhãs), e personagens
16 que são retomados em mais de um momento, como Okhwan Yoon, coreano que já passou por
17 mais de 190 países em sua grande viagem pelo mundo a bordo de sua bicicleta.

18 Essa aparência à primeira vista vai caindo por terra à medida que montagem, edição e trilha
19 sonora se juntam para transmitir o ritmo da evolução natural do dia, mais lento durante ____
20 primeiras horas do dia ou após o almoço, por exemplo. Além disso, durante o desenvolvimento
21 do filme, algumas curtas e interessantes antologias, como os trechos dedicados ____ nascimentos
22 ou ____ respostas para as perguntas propostas pelos produtores (o que você ama? Do que tem
23 medo? O que tem nos bolsos?), são mostradas e impedem que o espectador encare o filme como
24 um mero compilado aleatório de vídeos.

25 A montagem bem feita de Joe Walker merece aplausos em determinados instantes, como a
26 parte em que brincadeiras de soldados norte americanos em atividade são seguidas por registros
27 de um homem afegão empenhado em desmistificar a fama negativa de **seu** país; imagens essas
28 que, por sua vez, são alternadas com a preparação de uma mulher para uma video-conferência
29 com o marido, um soldado em atividade e distante devido à guerra. Essa bem-sucedida montagem
30 passa uma das mensagens do filme: mesmo em diferentes culturas e costumes, somos humanos
31 e podemos partilhar de um mesmo contexto, somos todos pessoas diferentes, mas unidos pela
32 humanidade. Em **sua** primeira aparição, o ciclista coreano contribui também para a transmissão
33 dessa mensagem ao se apresentar dizendo que nasceu na Coreia, não importa se na do Sul ou na
34 do Norte, e que está viajando o mundo descobrindo novas culturas e engrandecendo a si mesmo
35 enquanto pessoa.

36 O filme recebeu diversas críticas, entre elas a construção que pouco explora a heterogeneidade
37 de um material tão vasto, assim como a falta de uma diversidade de enfoques que poderiam
38 mostrar o efeito das grandes questões da vida na visão de diferentes culturas. Para muitos, essas
39 críticas se somam ao acabamento impecável e polido, que descaracteriza um pouco o amadorismo
40 da proposta, resultando em um filme profissional com estética amadorística forjada, que mais se
41 assemelha a um grande comercial da raça humana. A partir dessas críticas e retomando as
42 reflexões iniciais levantadas, fica claro que o diretor, em vez de tentar apresentar e questionar as
43 diferenças que dividem a humanidade, escolheu o caminho mais palatável: fazer uma obra que
44 exalta os sentimentos mais belos, harmonizando pessoas, raças, etnias e credos distintos, para
45 mostrar que, antes de qualquer coisa, somos humanos em busca de uma vida digna e nada mais
46 forte que o nosso dia a dia para tentar reproduzir o que somos.

Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em:
<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&tipo=resenha&edicao=129>

QUESTÃO 11 – A respeito da grafia de algumas palavras localizadas no texto, levando-se em conta o seu significado no contexto das frases em que aparecem, considere as seguintes afirmações:

- I. "homossexualidade" (l. 13) está escrita corretamente.
- II. "expectador" (l. 23) está escrita corretamente.
- III. "norte americanos" (l. 26) está escrita incorretamente, pois o correto é "norte-americanos".
- IV. "video-conferência" (l. 28) está escrita incorretamente, pois o correto é "videoconferência".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que apresenta, ao lado da palavra retirada do texto, um termo que semanticamente a substitua de forma correta.

- A) "inusitado" (l. 01) – insólito.
- B) "simplório" (l. 10) – genioso.
- C) "antologias" (l. 21) – resenhas.
- D) "desmistificar" (l. 27) – restabelecer.
- E) "forjada" (l. 40) – fortuita.

QUESTÃO 13 – As lacunas situadas no terceiro parágrafo do texto são, respectiva e corretamente, preenchidas com:

- A) as – a – as
- B) às – a – às
- C) as – à – às
- D) às – à – as
- E) as – a – às

QUESTÃO 14 – Qual das seguintes palavras extraídas do texto contém um dígrafo que representa vogal nasal?

- A) "imagem" (l. 15).
- B) "ritmo" (l. 19).
- C) "distante" (l. 29).
- D) "partilhar" (l. 31).
- E) "filme" (l. 36).

QUESTÃO 15 – Com base exclusivamente no que é exposto pelo texto, é correto afirmar que seu autor:

- A) Considera complexo o enredo de *A vida em um dia*.
- B) Julga ser o cotidiano o aspecto mais significativo na vida das pessoas.
- C) Encara o filme como um compilado de vídeos destituído de lógica.
- D) Entende ser a mensagem do filme defensora da dissidência da humanidade.
- E) Lembra os elogios recebidos pelo filme por explorar vastamente a heterogeneidade de seu material.

QUESTÃO 16 – As formas verbais "enviassem" e "contassem", situadas no primeiro período do texto, estão devidamente conjugadas na terceira pessoa do plural do:

- A) Presente do modo indicativo.
- B) Pretérito perfeito do modo indicativo.
- C) Pretérito imperfeito do modo indicativo.
- D) Presente do modo subjuntivo.
- E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

QUESTÃO 17 – No excerto “A montagem bem feita de Joe Walker merece aplausos em determinados instantes” (l. 25), se a palavra “montagem” fosse flexionada no plural, quantas palavras ao todo deveriam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal?

- A) Duas.
- B) Três.
- C) Quatro.
- D) Cinco.
- E) Seis.

QUESTÃO 18 – Considerando o contexto em que aparece na construção textual em análise, a locução conjuntiva “à medida que” (l. 18) exprime ideia de:

- A) Comparação.
- B) Oposição.
- C) Alternância.
- D) Proporcionalidade.
- E) Concessão.

QUESTÃO 19 – Os parênteses em destaque no terceiro parágrafo foram utilizados com a intenção de:

- A) Indicar a mudança de interlocutor.
- B) Incluir uma explicação dada.
- C) Fazer sobressair neologismos.
- D) Marcar a hesitação do autor.
- E) Exigir que o leitor supra com a sua imaginação uma ideia não concluída pelo autor.

QUESTÃO 20 – No fragmento “Essa bem-sucedida montagem passa uma das mensagens do filme” (l. 29-30), quanto a sua predicção, “passar” é um verbo:

- A) De ligação.
- B) Transitivo direto.
- C) Transitivo indireto.
- D) Bitransitivo.
- E) Intransitivo.

QUESTÃO 21 – O termo “apelo” (l. 02) é decorrente do processo de formação de palavras denominado derivação:

- A) Prefixal.
- B) Sufixal.
- C) Parassintética.
- D) Regressiva.
- E) Imprópria.

QUESTÃO 22 – Os pronomes “seu” e “sua”, em destaque no quarto parágrafo do texto, estão fazendo referência, respectivamente, a quais elementos?

- A) Joe Walker (l. 25) – montagem (l. 29).
- B) homem afegão (l. 27) – guerra (l. 29).
- C) Joe Walker (l. 25) – ciclista coreano (l. 32).
- D) homem afegão (l. 27) – ciclista coreano (l. 32).
- E) soldados norte americanos em atividade (l. 26) – filme (l. 30).

QUESTÃO 23 – Na frase adaptada do texto “O diretor escolheu o caminho mais palatável”, assinale a alternativa que mostra como ela seria convertida corretamente para a voz passiva analítica.

- A) O caminho mais palatável foi escolhido pelo diretor.
 - B) Escolheu-se o caminho mais palatável ao diretor.
 - C) O caminho mais palatável escolheu o diretor.
 - D) Escolheu-se através do diretor o caminho mais palatável.
 - E) O caminho mais palatável escolheu-se através do diretor.
-

QUESTÃO 24 – Tomando por base o que o texto explicita, observe as seguintes afirmações e a relação proposta entre elas:

- I. O documentário “A vida em um dia” é fruto de um profissionalismo associado a uma estética amadora, assemelhando-se a uma ampla propaganda da raça humana.

PORQUE

- II. Okhwan Yoon cruzou mais de 190 países com sua lancha para desbravar o mundo.

É correto afirmar que:

- A) Ambas as afirmações são falsas.
 - B) A primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - C) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - D) Ambas as afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.
 - E) Ambas as afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira.
-

QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa que mostra um trecho extraído do texto que contém uma locução verbal.

- A) Um inusitado projeto pediu para que pessoas do mundo todo enviassem vídeos em que contassem sua vida em um dia (l. 01-02).
- B) O retorno a esse apelo veio na forma de nada menos que 4.500 horas de imagens registradas por pessoas de mais de 190 nacionalidades (l. 02-03).
- C) *A vida em um dia* é também um filme simples, porém capaz de levantar algumas reflexões (l. 07).
- D) À primeira vista o filme pode parecer apenas um compilado de vídeos do YouTube (l. 10-11).
- E) A montagem bem feita de Joe Walker merece aplausos em determinados instantes (l. 25).

LÍNGUA PORTUGUESA

Só 4 amigos do Facebook realmente importam, diz estudo*Por Casey Williams*

01 Sua quantidade de amigos no Facebook é uma triste mentira.
02 Ter muitos amigos on-line não significa que você terá mais pessoas para lhe ajudar quando
03 estiver deprimido. Uma pesquisa publicada em janeiro pela revista *The Royal Society Open*
04 *Science* mostra que temos tendência de manter um grupo pequeno de amigos – seja na internet
05 ou na vida real.
06 Robin Dunbar, autor do estudo e psicólogo de Oxford, analisou uma pesquisa com 3.375
07 usuários do Facebook no Reino Unido. Descobriu que, apesar de contar com uma média de 150
08 amigos, essas pessoas procuravam apenas cerca de quatro deles durante uma "crise emocional".
09 Os usuários também buscavam apoio de cerca de 14 amigos devido ___ "empatia" entre eles.
10 As pessoas tendem a ter um número semelhante de amigos próximos na vida real, de
11 acordo com uma pesquisa anterior de Dunbar sobre redes sociais. Por isso, apesar de sites de
12 mídia social como o Facebook expandirem nossas redes on-line, eles na verdade não engrossam
13 nossas fileiras de amigos verdadeiros.
14 É por isso que manter amizades importantes, on-line e off-line, requer muito tempo e
15 esforço mental. "Criar amizades é muito caro em termos de tempo: para manter uma amizade,
16 você tem de investir muito tempo na pessoa, de outra forma a amizade inexoravelmente cairá
17 em qualidade", disse Dunbar ao The Huffington Post por e-mail.
18 Nada sobre as mídias sociais muda esse elemento essencial. Isso não significa que a
19 tecnologia nunca nos permita superar as limitações que _____ os grupos sociais dentro de
20 uma intimidade apenas relativa, diz Dunbar. A tecnologia que consegue aproximar interações
21 cara a cara também pode ter um maior peso na conquista de amigos na vida real.
22 A nova tecnologia "provavelmente precisa envolver visão e toque, porque ambas são
23 centrais em como interagimos uns com os outros (e fazem uma grande diferença em nosso nível
24 de satisfação sobre aquela interação)", Dunbar disse ao HuffPost.
25 As descobertas de Dunbar não significam que as amplas redes sociais não ____ valor. As
26 redes sociais on-line permitem que as pessoas coletem informações de um grupo de contatos
27 diverso e amplo, disse Nicole Ellison, professora da Universidade de Michigan, em entrevista ao
28 HuffPost por e-mail.
29 "Transmitir um pedido de informação através de uma atualização do 'status' é uma ótima
30 estratégia para conseguir uma resposta rápida de uma rede diversa", disse Ellison, que pesquisou
31 as redes de amigos do Facebook.
32 Dunbar conclui que pode ser mais fácil manter uma amizade utilizando as mídias sociais,
33 mas afirma que essas ferramentas não são suficientes para evitar que as amizades enfraqueçam
34 e que as redes encolham ao longo do tempo. Sem o contato cara a cara, as amizades tendem a
35 desaparecer.
36 O tempo gasto atualmente no Facebook para manter amizades que estão morrendo poderia
37 ser utilizado no desenvolvimento de novas amizades, mais significativas. E fazer novos amigos,
38 conclui Dunbar, é provavelmente uma melhor maneira de utilizar o próprio tempo. Se você não
39 se esforçar, aquele amigo do Facebook se tornará, inevitavelmente, "um conhecido" do passado,
40 Dunbar escreveu.

(Texto adaptado para esta prova: <http://super.abril.com.br/tecnologia/so-4-amigos-do-facebook-realmente-importam-diz-estudo>)

QUESTÃO 26 – Sobre as lacunas presentes no texto, analise as afirmações abaixo:

- I. Na linha 09, a lacuna ficaria corretamente preenchida por “à”, pois a regra para uso da crase é atendida: preposição a (regência de ‘devido’) + artigo a (palavra feminina ‘empatia’).
- II. A lacuna da linha 19 fica corretamente preenchida com o verbo “mantém”, porque o sujeito da frase é ‘tecnologia’ (l. 19).
- III. Na linha 25, o verbo que preenche corretamente a lacuna é “têm”, pois se refere a ‘amplas redes sociais’ (l. 25).

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Analise as afirmações abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na linha 12, o vocábulo “engrossam” é uma forma conotativa de dizer ‘aumentar em número’.
- () O vocábulo “caro” (l. 15) equivale a ‘estimado’ no contexto em que se encontra.
- () “Inexoravelmente” (l. 16) é um advérbio que, no contexto, significa ‘algo inevitável’.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – F.
- C) V – F – V.
- D) V – F – F.
- E) F – V – V.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que se afirma no texto.

- A) Um grande número de amigos em redes sociais não significa um grande número de amigos verdadeiros.
- B) Preservar amizades relevantes demanda esforços das pessoas.
- C) As pessoas são propensas a manter um grupo pequeno de amigos, tanto na internet quanto na vida real.
- D) As amizades podem até ser mantidas mais facilmente pelas redes sociais, contudo, sem o contato pessoalmente, elas podem acabar.
- E) As redes sociais, em suma, podem facilmente substituir a interação frente a frente entre as pessoas e manter as amizades.

QUESTÃO 29 – Sobre as relações entre letras e fonemas, assinale a alternativa INCORRETA sobre palavras do texto.

- A) A palavra ‘quantidade’ possui apenas um dígrafo vocálico.
- B) Em ‘significam’, há encontro consonantal e não há dígrafo.
- C) Na palavra ‘tecnologia’, o fonema C equivale à pronúncia de mais de uma letra.
- D) No vocábulo ‘conquista’, há apenas um dígrafo.
- E) Em ‘tempo’, há cinco letras e quatro fonemas.

QUESTÃO 30 – Na frase abaixo, a conjunção em destaque poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por:

“**Por isso**, apesar de sites de mídia social como o Facebook expandirem nossas redes on-line, eles na verdade não engrossam nossas fileiras de amigos verdadeiros”. (l. 11-13).

- A) Porquanto.
- B) Portanto.
- C) Porque.
- D) Porém.
- E) Pois.

QUESTÃO 31 – Analise as assertivas abaixo sobre alguns sinais de pontuação do texto:

- I. Na linha 04, o travessão poderia ser substituído por uma vírgula, sem causar prejuízos à estrutura da frase.
- II. Os dois-pontos da linha 15 poderiam ser substituídos por ponto final, sem causar alteração ao sentido empregado na frase.
- III. As vírgulas da linha 27 (2ª e 3ª ocorrências) separam um aposto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa que apresenta linguagem conotativa.

- A) O tempo gasto atualmente no Facebook para manter amizades que estão morrendo poderia ser utilizado no desenvolvimento de novas amizades, mais significativas (l. 36-37).
- B) Ter muitos amigos on-line não significa que você terá mais pessoas para lhe ajudar quando estiver deprimido (l. 02-03).
- C) As pessoas tendem a ter um número semelhante de amigos próximos na vida real, de acordo com uma pesquisa anterior de Dunbar sobre redes sociais (l. 10-11).
- D) A nova tecnologia "provavelmente precisa envolver visão e toque, porque ambas são centrais em como interagimos uns com os outros" (l. 22-23).
- E) Robin Dunbar, autor do estudo e psicólogo de Oxford, analisou uma pesquisa com 3.375 usuários do Facebook no Reino Unido (l. 06-07).

QUESTÃO 33 – Analise as afirmações abaixo sobre elementos de coesão do texto:

- I. O pronome possessivo 'sua' (l. 01) se refere ao leitor do texto, atribuindo-lhe "posse" da quantidade de amigos do Facebook.
- II. 'essas pessoas' (l. 08) retoma 'usuários do Facebook no Reino Unido' (l. 07).
- III. Na linha 12, 'eles' substitui 'amigos próximos' (l. 10).

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 34 – A palavra "tendência" (l. 04) poderia ser substituída, sem causar alteração semântica, por:

- A) Propensão.
- B) Vocação.
- C) Intenção.
- D) Dificuldade.
- E) Desejo.

QUESTÃO 35 – Na frase "As pessoas tendem a ter um número semelhante de amigos próximos na vida real" (l. 10), o sujeito pode ser classificado como _____, enquanto o verbo, em relação a sua predicação, é _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) composto – intransitivo
- B) simples – transitivo indireto
- C) paciente – intransitivo
- D) simples – transitivo direto
- E) indeterminado – transitivo indireto

GABARITO

1 A	2 D	3 E	4 A	5 D	6 B	7 C	8 D	9 C	10 E	11 E	12 A	13 E	14 C	15 B
16 E	17 C	18 D	19 B	20 B	21 D	22 D	23 A	24 C	25 D	26 D	27 C	28 E	29 D	30 B
31 E	32 A	33 C	34 A	35 B										

INFORMÁTICA


1. VUNESP 2017 TJ-SP - Escrevente Técnico Judiciário

No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário aciona o Explorador de Arquivos, seleciona um arquivo e pressiona a tecla F3. Em seguida,

- a) o arquivo será deletado definitivamente.
- b) as propriedades do arquivo serão exibidas.
- c) o arquivo será deletado e colocado na Lixeira.
- d) a Ajuda do Windows 10 será ativada.
- e) o cursor será colocado no campo de busca da Ferramenta de Pesquisa.

2. VUNESP 2017 TJ-SP - Escrevente Técnico Judiciário

No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre da Área de Trabalho, e a seguinte lista de opções surgiu na tela.



Esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na Área de Trabalho, e, para isso, ele deve clicar em

- a) “Exibir”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na tela, e seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.
- b) “Novo”, em seguida, digitar o nome do atalho na janela que surge na tela.
- c) “Novo”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na tela, e seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.
- d) “Atualizar”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na tela, e seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.
- e) “Exibir”, em seguida, digitar o nome do atalho na janela que surge na tela.

3. VUNESP 2017 TJ-SP - Assistente Social Judiciário

Para navegar na internet por meio do MS-Windows 10, em sua configuração padrão, o aplicativo padrão é o

- a) Microsoft Edge.
- b) Microsoft Internet Explorer 10.
- c) Microsoft Safari.
- d) Microsoft Internet Explorer 11.
- e) Microsoft Chrome.

4. VUNESP 2017 TJ-SP - Assistente Social Judiciário

No ambiente do MS-Windows 10, em sua configuração padrão, no aplicativo acessório WordPad (e em grande parte dos aplicativos em ambiente Windows), quando se deseja selecionar um parágrafo todo, pode-se

- a) dar um triplo clique, com o botão principal do mouse, no parágrafo desejado.
- b) dar um duplo clique, com o botão principal do mouse, no parágrafo desejado.
- c) clicar com o botão secundário no parágrafo desejado e escolher “marcar o parágrafo todo”.
- d) dar um duplo clique, com o botão secundário do mouse, no parágrafo desejado.

e) marcar uma palavra do parágrafo desejado e clicar uma vez com cada botão do mouse.

5. VUNESP 2017 TJ-SP - Escrevente Técnico Judiciário

No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os **nomes de arquivos ou pastas** seguem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que

- a) o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e do seu caminho.
- b) o nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como \ / : * ? " < > |, mas a sua extensão pode incluí-los.
- c) os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres.
- d) caracteres como \ / : * ? " < > | podem ser utilizados nos nomes no Windows 10.
- e) o nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como \ / : * ? " < > |, mas o nome do seu caminho pode incluí-los.

6. VUNESP 2017 | TCE-SP | Agente de Fiscalização

Em um computador, instalou-se o MS-Windows 7, em sua configuração padrão. Avalie o quadro a seguir, que apresenta **a pasta Arquivo** e três possíveis situações nas quais se deseja colocar determinados arquivos nessa pasta:

	1	2	3
Nome da pasta	Arquivo	Arquivo	Arquivo
Arquivos que se deseja colocar na pasta	Arquivo Arquivo.doc Arquivo.xls	Arquivo.jpg Arquivo.doc Arquivo.xls	Arquivo Arquivo.doc Arquivo.doc

Assinale a alternativa que contém a(s) situação(ões) que é(são) válida(s) no MS-Windows 7.

- a) Apenas 1.
- b) Apenas 1 e 2.

- c) Apenas 2.
- d) Apenas 3.
- e) 1, 2 e 3.

7. VUNESP 2017 | TCE-SP | Agente de Fiscalização

Suponha um computador com o MS-Windows 7, um HD interno e um mouse, todos em suas configurações padrão. Uma das formas de colocar diretamente uma cópia de um arquivo na pasta B, sendo que esse arquivo encontra-se originalmente na pasta A desse HD, sem apagá-lo da pasta A, é arrastando-o. Para tanto, deve-se selecionar o arquivo, manter pressionada uma tecla e manter pressionado um dos botões do mouse. Essa tecla e o botão são, respectivamente:

- a) ALT e esquerdo.
- b) SHIFT e direito.
- c) CTRL e esquerdo.
- d) ALT e direito.
- e) CTRL e direito.

8. VUNESP 2017 | TCE-SP | Agente de Fiscalização

No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se alternar entre a janela ou os programas que estejam abertos, por meio do pressionamento da combinação de teclas:

- a) ALT+TAB
- b) WINKEY+ESC
- c) CTRL+TAB
- d) WINKEY+ CTRL
- e) CTRL+ESC

9. VUNESP 2018 | IPSM | Analista de Gestão / Contabilidade

Observe a imagem a seguir, retirada do aplicativo acessório padrão Windows Explorer, do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, que mostra uma lista de arquivos em uma pasta qualquer.




Um usuário clica com o botão principal do mouse no arquivo “arq1.bmp” e, mantendo a tecla SHIFT do teclado pressionada, clica em “arq6.pptx” e, ainda com a tecla SHIFT pressionada, clica em “arq4.txt”.

O número de arquivos que permanecerão selecionados após as ações descritas é

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 6.

10. VUNESP 2018 | IPSM | Assistente de Gestão Municipal

A imagem a seguir foi feita no Windows Explorer, do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, e mostra 3 arquivos selecionados.




Ao apertar a tecla Enter, com os 3 arquivos selecionados,

- a) apenas o primeiro arquivo (doc1.txt) será aberto.
- b) apenas o último arquivo (doc3.txt) será aberto.
- c) nenhum arquivo será aberto.
- d) todos os arquivos serão abertos
- e) uma janela de confirmação de ação será aberta.

11. VUNESP 2018 | IPSM | Assistente de Gestão Municipal

Observe a imagem a seguir, retirada do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.



A parte mais à direita na imagem tem a funcionalidade de

- a) abrir o Menu Iniciar.
- b) mostrar a Área de Trabalho.
- c) ajustar data.
- d) ajustar hora.
- e) bloquear a tela.

12. FADESP 2017 COSANPA - Engenheiro Civil

O Cortana, assistente virtual da Microsoft que permite que o usuário faça consultas e pedidos por meio de interação por voz ou texto, está disponível, em português, no

- a) Windows XP.
- b) Windows 7.
- c) Windows 8.
- d) Windows 10.

1-E	2-C	3-A	4-A	5-A	6-B
7-C	8-A	9-D	10-D	11-B	12-D

Bateria 02 de Questões Windows

Obs.: As questões que se referem a versões anteriores, também se aplicam ao Windows 10

01 - Consulplan CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ 2017 - ALMOXARIFE

“No Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (configuração padrão), um usuário está tentando renomear uma pasta onde armazena os seus arquivos de música.” É um nome válido para o diretório, APENAS o que foi apresentado em

- A) musicas:2017. B) musicas|2017. C) musicas#2017. D) musicas*2017.

02- Consulplan CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ 2017 - ALMOXARIFE

No Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (Configuração Padrão – idioma Português Brasil), as teclas de atalho utilizadas para fechar a janela atual são:

- A) Ctrl+F. B) Ctrl+E. C) Ctrl+S. D) Ctrl+W.

03 - (CONSULPLAN 2008 – Pref. Manhumirin)

O relógio do Windows XP aparece no canto direito inferior da tela. Este local tem o nome de:

- a) Área de trabalho
- b) Barra de Status
- c) Barra de Ferramentas.
- d) Inicialização Rápida.
- e) Área de Notificação

04 - (CONSULPLAN 2010 MUNICÍPIO DE REZENDE RJ)

Na organização de arquivos com o Windows Explorer, assinale a alternativa que descreve **INCORRETAMENTE** a função de teclas de atalho:

- A) F5 – Atualizar exibição.
- B) F2 – Renomear um arquivo selecionado.
- C) Shift + Delete – Excluir permanentemente um arquivo selecionado.
- D) Delete – Mover arquivo selecionado para a lixeira.
- E) Ctrl + T – Selecionar todo o conteúdo do diretório atual.

05 - (CONSULPLAN 2011 CESAN)

O Windows é o Sistema Operacional mais utilizado do mundo, criado em 1981, pela empresa Norte Americana, Microsoft. O produto tinha como objetivo o desenvolvimento de um Gerenciador de Interface Gráfica, possibilitando o uso do mouse em uma interface cheia de janelas. São características do Microsoft Windows XP:

- A) Sistema Operacional monotarefa e monousuário.
- B) Sistema Operacional multitarefa e monousuário.
- C) Sistema Operacional monotarefa e multiusuário.
- D) Sistema Operacional multitarefa e multiusuário.
- E) Sistema Operacional multitarefa e com Kernel aberto.

06. 2016 CRO – SC Advogado

O Microsoft Windows 10 introduziu em uma de suas atualizações um agente digital que com a função de ajudar o usuário a realizar tarefas como enviar lembretes com base na hora, em locais ou em pessoas; rastrear pacotes, interesses e voos; enviar e-mails e SMSs; gerenciar o calendário; criar e gerenciar listas; encontrar fatos, arquivos, locais e informações. Esse agente digital pode ser controlado por voz ou pelo teclado e seu nome é:

- a) Siri.
- b) Talk.
- c) Edge.
- d) Cortana.

GABARITO

1 - C	2 - D	3 - E	4 - E	5 - D	6 - D
-------	-------	-------	-------	-------	-------